

UN TRECHUS NOUVEAU DU RETEZAT

par

Dr. R. JEANNEL

Professeur à l'Université de Cluj.

Reçu le 15 mars 1929.

73

R. JEANNEL

BCU Cluj / Central University Library Cluj

UN TRECHUS NOUVEAU DU RETEZAT.



Trechus (s. str.) *Melisso* 73 — Long. 4,8 à 5,5 mm. Antère.
Epais et robuste, après un premier tiers comme d'habitude et large que
le *T. laticornis* Pate., mais plus grand et de coloration toujours bien de
poix uniforme et assez clair, avec les antennes et les pattes roussâtres.
Tête relativement petite, deux fois aussi longue que
les torques, celle-ci plus courte, à trons convexes qui chez *T. laticornis*
Antennes 6-7. Pronotum très
transverse, son luis et domie aussi large que long, la base très large,
les angles
les angles postérieurs qui sont pointus et vifs; base reculée. Desque les
fossettes basales du pronotum comme chez *T. laticornis*, la postière marginale
plus étroite. Elytres très larges, convexes, élargis après le milieu,
atténués à l'apex. Les élytres
les élytres 7-8. Stries faiblement ponctuées,
toutes simples, mais les externes les superficielles, comme chez *T. laticornis*.
Dixième article spécial inflexé en dedans et continué
par la 2^e stria. Patter égales, les femurs rouges, les tibiae antérieurs
suffoqués, le premier article des tarses postérieurs des mâles simple.
Lignes orbitaires divergentes en avant. Première soie discale de
l'élytre au quart bas; de la 2^e stria, la deuxième soie vers le milieu.
Organe copulateur analogue à celui du *T. laticornis* (?), mais bien
plus allongé, sa partie apicale bien plus longue et droite, le bec acéré
et un peu recourbé au sommet. Ses lobes latéraux élargis, qui
recouvrent une pièce copulatrice courte, triangulaire, à sommet droit et
apex à bords épais et nullement ondulés comme le sont ceux de
T. laticornis.

(*) R. Jeannel, Monographies des Trechus, 2^e partie, 1927, p. 118, Pl. III, Fig. XXXII (1929).

UN TRECHUS NOUVEAU DU RETEZAT

par le

Dr. R. Jeannel

Professeur à l'Université de Cluj.

Reçue le 18 mars 1929.

Trechus (s. str.) **Mallászi** n. sp. — Long. 4,8 à 5,5 mm. Aptère. Épais et convexe, ayant un peu la même forme robuste et large que le *T. latus* Putz., mais plus grand et de coloration toujours brun de poix uniforme et assez clair, avec les antennes et les pattes rougeâtres. Tête relativement petite, arrondie; les yeux deux fois aussi longs que les tempes, celle-ci plus courtes et moins convexes que chez *T. latus*. Antennes courtes et épaisses, comme chez *T. latus*. Pronotum très transverse, une fois et demie aussi large que long, la base très large, les côtés très peu arrondis, en courbe régulière, à peine sinués avant les angles postérieurs qui sont petits et vifs; base rectiligne. Disque et fossettes basales du pronotum comme chez *T. latus*, la gouttière marginale plus étroite. Élytres très larges et convexes, élargis après le milieu, atténués à l'apex, les épaules arrondies. Stries finement ponctuées, toutes visibles, mais les externes très superficielles, comme chez *T. banaticus* Dej. Striole récurrente apicale infléchie en dedans et continuée par la 5^e strie. Pattes courtes, les fémurs renflés, les tibias antérieurs sillonnées, le premier article des tarses postérieurs des mâles simple.

Lignes orbitaires divergentes en avant. Première soie discale de l'élytre au quart basal de la 3^e strie, la deuxième soie vers le milieu.

Organe copulateur analogue à celui du *T. banaticus* (1), mais bien plus allongé, sa partie apicale bien plus longue et droite, le bec acéré et un peu retroussé au sommet. Sac interne tapissé d'écaillés, qui cachent une pièce copulatrice courte, triangulaire, à sommet étroit et aigu, à bords épais et nullement onduleux comme le sont ceux du *T. banaticus*.

(1) R. JEANNEL. Monographie des Trechinae, 2^e partie, p. 358 (*L'Abeille*, Paris, XXXIII, 1927).

Quelques exemplaires recueillis par J. de MALLÁSZ, dans des dolines en forêt, à „Câmpul Şelului“, sur le versant méridional du Retezat, le 31. VII. 27.

Ce *Trechus* appartient au groupe de *T. banaticus*, mais il est très remarquable par sa grande taille et sa forme particulièrement large et épaisse.

UN TRECHUS NOUVEAU DU RETEZAT

par le

Dr. R. MALLÁSZ

Professeur à l'Université de Cluj

Cluj le 18 mars 1939

Trechus (s. str.) Mallász n. sp. — Long. 4,8 à 5,5 mm. Ant. 10.
 Corps et convexité, ayant un peu la même forme robuste et large que
 le *T. lateralis*, mais plus grand et de coloration toujours brun de
 noir uniforme et assez clair, avec les antennes et les pattes roussâtres.
 Tête relativement petite, arrondie; les yeux deux fois aussi larges que
 les antennes, celle-ci plus courtes et moins convexes que chez *T. lateralis*.
 Antennes 10-segmentées, les 2^{es} et 3^{es} segments plus courts que les 4^{es} et 5^{es}.
 BCU Cluj / Central University Library Cluj

Antennes 10-segmentées, les 2^{es} et 3^{es} segments plus courts que les 4^{es} et 5^{es}.
 traversée, une fois et demie aussi large que long, la base très large,
 les côtés très peu arrondis, en coupe rétrécie, à peine sinués avant
 les angles postérieurs qui sont petits et vifs; base renflée. Pédicel
 fossettes basales du pronotum comme chez *T. lateralis*, la configuration marginale
 plus étroite. Élytres très larges et convexes, élargis après le milieu,
 allongés à l'apex, les épaules arrondies. Stries linéaires ponctuées,
 toutes visibles, mais les extrêmes très superficielles, comme chez *T. ba-*
 naticus. Stigole ventrales spicales indécises en dedans et continuées
 par la 6^e strie. Pattes courtes, les femurs renflés, les tibiaux antérieurs
 sillonnés, le premier article des tarses postérieurs des mâles simple,
 lignes orbitaires divergentes en avant. Premiers soix-dix-sept
 l'élytre au quart basal de la 8^e strie, la douzième soix vers le milieu.
 Organes copulateurs analogues à ceux de *T. banaticus* (1), mais bien
 plus adaptés, sa partie apicale bien plus longue et droite, le bec accré-
 té et un peu renflé au sommet. Sac interne tapissé d'écaillures, qui
 cachent une pièce copulatrice courte, triangulaire, à sommet droit et
 aigu à bords égaux et nullement ondulés comme le sont ceux du
T. banaticus.

(1) H. MALLÁSZ, Monographie des *Trechus*, 2^e partie, p. 308 (L'Annick, Paris, XXXII, 1937)