

ERDÉLYI GAZDA

AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI EGYLET

HIVATALOS

KÖZLÖNYE.

Megjelenik minden pénteken egy iven és az egyleti tagoknak ingyen küldetik meg.

Nem tagok egész évre 4 frt, félévre 2 frttal fizethetnek elő, negyedéves előfizetés el nem fogadtatik.

Pénz- és értékküldemények az ERDÉLYI GAZDA KIADÓ-HIVATALÁHOZ (Dr. Hintz György, e. pénztárnokhoz), a lap szellemi részét illető közlemények az ERDÉLYI GAZDA SZERKESZTŐSÉGÉHEZ (Gamauf Vilmos, e. titkárhoz) czímezendők.

A hirdetési díjszabályzatot lásd az utolsó lapon

Szerkesztő bizottság: elnök **Paget János; Berde Áron, Szabó Samu, Szentgyörgyi József, Vörös Sándor,**
felelős szerkesztő: **Gamauf Vilmos.**

Tartalom: Havi emlékeztető: Aprilis. — Egy agy-hólyagféreg érdekes esete szarvasmarhánál. Dr. Mina János. — Ha azt akarjuk, hogy teremjenek, gondozni kell a réteket is! Kodolányi Antal. — A nemes lúz dugványozásáról. E nyedi. — Új szaklapok. — Értesítés. — Aprilis havi közmondások. — Vidéki gazdasági tudósítások: Tövis, Földvár-Hidvég, Vingárd, Sz.-Keresztur, Mocs, Egerpatak, Toroczko, Radnót, Kendi-Lóna, Cserhalomtáj. — Szerkesztőségi üzenetek. — Piaczi árak. — Hirdetések.

Havi emlékeztető.

Aprilis.

Ház és udvar. Megmaradt szénaboglyák és szalmakazlak ismétellen befedetnek. A téli és tavaszi szelek által megrongált épületek kijavitása megkezdetik.

Kazal és asztalgénekek a trágya dombra szállíttatnak, vagy szétterítve nyári almozásra fölhasználhatók.

Gulyaálláson a törökbusaszár vagy egyéb szalmaféle kúpkba hányva, nyári tüzelőt pótol.

Legelőkön lévő vályuk, kútak, aklok, használható állapotba helyeztetnek.

Szántó föld. A tavaszi szántás, vetés folytatva bevégeztetik.

Veremből és pinczéből a burgonyák kiszedendők, leendő vetésre kiválogattatnak és azonnal eke vagy kapa után elvetetők.

Törökbuza vetés e hó közepén megkezdetik és pedig szórva, eke után, vagy sorvető géppel. Utóbbi vetés mód azért előnyös, mert a növények sorai kapáló és töltőgető ekével mivelhetők, tehát megkíméltetik a kézimunka.

Tököt, paszulyt vehetünk a törökbuza közé.

Zöld takarmánynak törökbuszát kevés czirokkal és kölessel most vehetünk.

A luczernások fogasolása legsürgösebb teendőink közé tartozik.

A kikelt zabvetések száraz időben meghengereztetnek.

Rét és kaszálók legeltetése szigoruan tiltatik, ha csak szénaterméscinket szándékosan apasztani nem akarjuk.

Szénamurva vagy fümagvak, a ligetes vagy gyéren benőtt helyeken elhínthetők.

Kaszálókra összel hordott burgonya szár vagy egyéb szálas trágya összegereblyéltetik és elszállíttatik.

Állattenyésztés. Az igás ökör és fejőstehenek takarmány roszsal élelmezhetők. Száraz takarmányhoz szokott állatok csak lassu átmenetben szénával vágy szalmával keverve szoktattassanak hozzá.

Esőben nemcsak a talaj kérgesedik meg, hanem a jármók nyakát feltöri a járomfa. Kisebesedés esetében a nyak ólomcetes vízzel vagy szappanos borszesszel bedörzsölendő.

E hó végén gulya-ménes füre kerül; szükséges azonban reggelenként kevés szénát-szalmát adni, nehogy deres vagy egészen gyenge füvet kénytelenítségük enni és meghűlések vagy veszedelmes hasmenések mutatkozzanak.

Csikós kanczák kijárhatnak ugyan, de minden meghűléstől óvatnak és a gyepelés daczára rendes abraolásban részesülnek.

A juhok már megélnék a legelőn, de el ne mulasszuk sóval ellátni őket. Hídeg esőben az anyajuhok bárányukkal fedél alá hajlandók, nehogy a fiatal gyenge állatok megfázzanak és tömeges elhullásuk által károsodjunk.

A meddő sertések ugaron, gyepen élnek, a szoptatós koczák még zsákra szorulnak, a malacok most szoknak ételre. Száraz tiszta aljról folytonosan gondoskodunk.

Szőlő. A szőlőt általánosan kiköjtjük; az első kapálást végezzük lehetőleg mélyen és darabosan, hogy szellőzzék és melegedjék a talaj; meredek hegyoldalokon gondoskodni kell, hogy a rohamos esők a föld javát le ne mossák és azért kapálás után minden ötödik sor között kapával nagyon esekély menedékes árkot huzunk, melyben a víz ereje mindannyiszor megtörvén, a magával sodort földet lerakhassa.

Új szőlők ültetésének most az ideje; az ültetésre szánt helyet egyenes — északról délre irányuló — sorokra mérjük ki négyszögben egymástól minden irányban 1 meter távolságra; az így kijelölt pontokon ásunk egy 45 centimeter mély, ugyanolyan hosszú és 30 centimeter széles gödröt, ennek fenekére teszünk egy jó marék teljesen elkorhadt trágyát, réa egy ujjnyi porhanyó földet, most befekettetjük harántékosan — a hegynék dőlve — a vesszőt úgy, hogy csak felső szeme nézzen ki a földből és hegynék álljon, a gödröt termékeny földdel betöltjük és gyöngén megtapossuk és a vesszőnek künmaradt hegyét

egy marék földdel betakarjuk. Ha csak lehet mindig gyökere vesszőket ültessünk, mert biztosabban fogannak és korábban jutnak termésre; ültetéskor úgy kell azokat megkarítani, hogy az alsó erősebb gyökereket 2 ujjnyira, a felsőbekeket 1 ujra lemetszük, a helyén ülő hajtások közül a leg-erősebbet egy szemre visszavágjuk, a többit teljesen lemetszük, a nap heve és a szárító szél ellen vízzel telt cseberbe állítjuk vagy nedves pokróczba takarjuk.

Ha ezen munkákkal készek vagyunk, állítunk szőlőiskolát; az e célra szánt vesszőket egy hétig vízbe áztatjuk. A vesszőknek fél méter hosszúnak kell lenni és csak olyan tökökről szedjük, melyek a faj jellegét leginkább kitüntetik, legszebben díszlenek és jó termést hoznak; erre mindeddig kevés gondot fordítottak, pedig nagy fontosságú s eléggé nem ajánlhatjuk követésre, hisz állatainknál is mindig a legkötelesebb példányokat választjuk magunknak, mert tudjuk, hogy egészséges ép szülőknek több valószínűséggel lesz ép és szép utódjuk; így nyeriünk nemes állatokat és így lesznek a növényfajok is valóban nemesek.

Pinczében az uborok másodszer lehuzataak és most már lehetőség elzárva a légtől, mert a hosszas szűreseléssel sok szesz és különösen sok illat menne kárba; ha borod még nem tiszta, — de különben egészséges — ne aggódj érte, majd elkészül a negyedik lehuzásig, csak telve álljon mindig a hordó és tiszta legyen pinczéd!

Gyümölcsös. Ha a fák ültetését eddig nem végeztük be, úgy azt most a hónap elején okvetlenül be kell végezni. A fák gyökerei beiszapolandók, a kiültetett fák körül a földet rövid szalma vagy polyvával hintjük be, hogy ezáltal megakadályozzuk a nedveség kigőzölését, hogy az mindig egyenlő hőmérsékű maradjon. A gyenge fák mellé rakott karókat szorgalmasan meg kell vizsgálni, a rozsak és hiányzók után pótolatnak, ezek kötéseit átvizsgálандók, ha elromlottak vagy meggyengültek, azok újra kötendők. A gyümölcsfák oltása folytattatik. A télen irt jegytáblák (czinkusok) elhelyezendők.

Faiskola. A csemeték metszése, utó vagy pótolása végeztetik. A megfogamzott szemzés csapra metszendő. Nemesítő és magiskolák megkapalandók és tisztán tartandók. A vadoncok, ha 3—4 levéllel bírnak, kiszedendők és szivgyökereiket átültetéskor vissza kell csipdesni, mindezen munkát borult időben kell végezni. Eleven kerítéseknél a csemeték kiültetendők.

Konyhakert. A magnak való növényeket, u. m. káposztafélék, répa, czékla, murek, petrezselyem, pasztinák, zeller és hagymafélék kiültetendők. Mindenféle borsó, spenót, retek, répa-félék, hagymák szabadon veteményezhetők. Ha szép időjárás van, szabadban kísérletképen paszulyt vethetünk. Korai káposzta, salátafélék és zeller a melegágyakból a szabadba kiültetendők. Burgonyát és törökbuszát ültessünk a konyha szükségletére. Hónapos retek és saláta szabadban vethető. Az eprek indái eltávolítandók, a föld szecska és mohával befedendő, hogy az eprek földdel meg ne teljenek. Ablak nélküli melegágyakat készítettünk a szabadban kiültetendő plánták számára. Melegágyakban, cserépekben a szabadban kiültetésre dinnye és ugorkamagot vethetünk. A melegágyak gondosan szellőztetendők, meleg, napfényes időben az üvegláblák levétetnek és estére megint visszahelyeztetnek az gyékény vagy szalmatakaróval látandók el. Ha a melegágyak kezdenek kihűlni, azokat friss trágyával kell körül rakatni. Ugorka, paszuly, hónapos retek, saláta, melyek melegágyakban neveltettek, kiszedhetők.

Diszkert. Diszfák és cserjék átültetése bevégeztetik. A tüleveleű fákat akkor kell átültetni, mikor hajtani kezdenek. A virágágyasok beültetendők egy és két évi virágokkal, u. m. nefelets, miosotis, silene és császárszakállal. A szegélyezésre használt növények átültetendők. Azon virágok, melyek az átültetést nem kedvelik,

most rendeltetési helyökre vettetnek, u. m. Collinsia, Convulvulus, Delphinium, Ajacis, Escholtzia, Ipomea, Lathyrus, Lavatera, Lupinus, Nemophila, Reseda. A gyepeket javítani és a szükséghez képest ujjakat kell alakítani. A gyepek széleit élesen le kell vagdálni; az utaknál arra kell ügyelni, hogy azok egyenlő szélesek legyenek és azokat poronddal meg kell hordatni. A nyári virágok, ha az időjárás megengedi, ágyasokba kiültetendők. A szőnyeg (Teppich) ágyasoknak való növények a melegágyakból kiültetendők és az időjárás szeszélyei ellen védendők. Virágházakban a melegházi és virágágyasokban való növények átültetendők. Az oltott cserjék, díszfák és rózsákat szoktatni kell a szabad levegőhöz és ezért azokat naponta friss szellős helyre kell tenniük. Georgina hajtásokat le kell vágatni s azokat porondos földre szaporítás végett üvegházak vagy melegágyakban dugványozni kell.

Méhészet E hóban megnyílik a mező méheink számára, kitehetjük hát, illetőleg kibocsáthatjuk népség tekintetében gyengébb kasainkat is. A szabadbani méhészkedés megkezdésétől kezdve minden figyelmünket a kellő vizsgálatásra irányozzuk. A legcsekélyebb tisztátalanság is úgy mint penész, egerrágcsálás stb. Indtollal vagy jó éles lépmetsző késsel eltávolítandó, nehogy a viaszmoly pondróinak eszközül szolgáljon. A lépet, ha szerfellet elpenészesedve vagy egerek által megrongálva nincs, kímetszeni káros, ez ellen valamennyi méhészt tekintély fel is szólal, a fiasításig gyakorolt metszés pedig még inkább hibáztatandó. A méhlikokon nyílásokat, repedéseket ne tőrjünk, a gyengébbek röplyukat kis ujjnyira szűkítsük, hogy a rablók annál kevésbé férhessenek hozzájuk. Ha valamely család meganyatlanodnék, (királynét vesztené), egyesítsük egy jóra való gyeuge családdal. A mely család öctési segélyünkre szorult azt tiszta, egészséges, jó mézzel tápláljuk mindaddig, míg a mező elegendő eleséget nem nyújt. Most az ideje, hogy a herelépet kivágyuk és helyébe munkásméh sejtés lépet ragasszunk.

Erdészet. A fahasználat a fák szállításán kívül a magas hegyeken fekvő erdők letarolására terjed ki. A cserhántásra szánt erdők szintén letarolandók és a fák lehámozandók. Mellékhahasználat. A vigályítás és szurokgyűjtés folytatandó, a köztes használatra kiadott területek mivélés alá vevendők. A szükséges vesszők e hóban gyűjtendők és a legeltetésre szánt területek kiadandók. Erdővédelem. A fatapasok ellen védjük az erdőt és a víz által okozott károk helyreállítására, valamint a behajtott marhák által okozható károk elhárítására figyelemmel legyünk. Erdőmivélés. A vetés, ültetés és dugványozás folytatandó és az erdei kertek szorgosan gyomlalandók. Vadászat. E hónapban a fajdkakasok, őzbakok, vadgalambok és vizimadarak lelőhetők.

Egy agy-hólyagféreg érdekes esete szarvasmarhánál.

Az agy-hólyagféreg — *coenurus cerebri* — a juhoknál, illetőleg a bárányoknál nem ritka, sőt lehet mondani igen gyakori baj szokott lenni és kergekör elnevezése alatt ismeretes, de a szarvasmarhánál ez mégis ritkábban fordul elő és e miatt tartom érdekesnek ezen általam észlelt egy esetét a gazda közönséggel közölni.

Az agyban előforduló hólyagféreg — *coenurus cerebri* — mely az agyra való nyomása által az ugyevezett kergekört idézi elő, nem más mint a kutya belében előfordulni szokott egyik galand-féregnek — *Taenia coenurus* — átváltozási vagyis fejlődési alakja.

Ugyanis galandféregnek — *Taenia* — nevezzük az álla-

ti belekben előforduló, sokszor több meternyi hosszú és egy főből — scolex — és határozott, vagy határozatlan izekből álló férget. Ezen izek a főtől minduntalan szaporodnak, a hátsó érett izek pedig elválván, a bélsárral letéttnek és ha egy ilyen elvált, érett iz — proglottida — más állat által a takarmánnyal fölvetetik, abban a hólyagféreg fejlődik ki. Ha az ilyen fejlődött hólyagféreg ismét más megfelelő állat által felvetetik, annak beleiben újból a galandféreg fog kifejlődni. Az idő, mely alatt ezen fejlődés létesül, mintegy hat hét. Igaz, hogy minden galandféregnek megfelelő hólyagférgé még nem ismeretes, de a legnagyobb része igen. A kutya szervezetében 5. különféle galandféreg fordul elő u. m.

1. A *Taenia serrata*, a fűrészkes galandféreg, ennek hólyagférgé — *Cysticercus pisiformis* — a mezei- és házi nyul májában, tüdejében és savóhártyájában szokott előfordulni.

2. *Taenia marginata*, a szélelt galandféreg, ennek hólyagférgé — *Cysticercus tenuicollis* — a juh, keeske, disznó és szarvasmarha mell- és hashártyájában és a májban szokott előfordulni.

3. *Taenia coenurus*, agyhólyagos galandféreg, ennek hólyagférgé — *Coenurus cerebralis* — a juh és ritkán a szarvasmarha agyában és némelykor a gerinczagyban szokott előfordulni.

4. *Taenia echinococcus*, háromizű galandóc, ennek hólyagférgé — *Cysticercus polymorphus* — a füevő állatok különböző szerveiben és a disznó és emberi szervezetben is előfordul.

5. *Taenia cucumerina*, tökmaghoz hasonló galandóc, ennek hólyagférgé ismeretlen. Melnikov állítása szerint, a kutya-tetű szervezetében fordulna elő.

Ezen elősorolt öt különböző galandóc közül legnagyobb érdekességgel bír a *Taenia coenurus* és a *Taenia echinococcus*; az első a mennyiben legtöbb kárt okoz házi állatainknál, a másik a mennyiben veszedelmes lehet az ember egészségére és életére. Jelenleg csak a *Taenia coenurust* fogom bővebben tárgyalni, a mennyiben okozója a fentnevezett betegségnek.

Ezen kifejlődött galandócznak tartózkodási helye a kutyanak vékony belei.

Feje kicsi, körtve alakú, ormánya egy kettős horgas koszorúval (számra nézve 24—28 vagy 32.) körözve, a négy szopó szerv a szegleten elhelyezve. Nyaka sima, a mellső izek nagyon rövidek, a középtájon levők szegletesek, a hátsók sokkal hosszabbak mint szélesek; az izeknek hátsó széle egyenes, az érett izek — proglottidák — 4—6 m. m. hosszúak és 2—3 m. m. szélesek, a kettős ivaranyilások az oldalszéleken elhelyezve. Az egész féregnek hossza 400 m. m., némelykor egy meternyi hosszú is. A lerakott peték nedves talajon 4. hétig fenntartják életképességüket, száraz helyen 2. hét alatt elpusztulnak.

Ennek hólyagférgé a kérődző állatok agyában, vagy — de nagyon ritkán — a gerinczagyban szokott előfordulni; a hólyag különböző nagyságu, kölesmagtól egész tyuktojás mekkoraságig, alakja gömbölyded vagy tojásdad és hártája átlátszó. A belső felületen számtalan szabadszemmel látható fejtű szemcsék, fejecskék, scolexek, a jövődöbéli galandócznak feje

láthatók, a melyhez alakjára nézve egészen hasonlít és csak nagyságra nézve kisebb, a mennyiben a nyakkal együtt csak 2—4. m. m. hosszú.

A kutyánál a galandféreg jelenléte csak is a lerakott bélsárban található érett izek által ismerhető fel.

A kérődző állatok agyában levő hólyagféreg jelenléte az állatok rendellenes mozgásai által tudható meg, a mennyiben az állat jobbfelé körben forog, ha a féreg a jobb nagy agyféltekében van elhelyezve; balra, ha a bal nagy agyféltekében van. Letartott fővel jár az állat és bukfeneczet vet, ha a féreg az agy mellső részében van elhelyezve és egyenesen fölfelé tartja fejét mint egy vitorla és hátra felé esik menés közben, ha a féreg a kis agyban van elhelyezve.

Gyógykezelési szempontból a gazdánál többnyire csak a hólyagféreg által előidéztet kergékör jön tekintetbe és a gyógykezelési javaslat a hólyagféreg eltávolításából áll, mely a koponyáit megnyitása és a hólyagféregnek kihúzása által eszközölthetetik. De ezen műtét sokszor nem sikerül, mivel a hólyagféreg elhelyezése igen gyakran nehezen található fel és az agyban, mint az élet fenntartására annyira fontos szervben nagy sértések veszély nélkül nem ejthetők. Körülbelül $\frac{2}{3}$ -da az operált állatoknak elpusztul és csak $\frac{1}{3}$ -ánál sikerül a gyógyulás műtét után. E miatt a juhtartó gazdára fontosabb eljárás a mennyire lehet inkább elhárítani a betegséget, mint azt gyógykezelti. Elérheti pedig azt a juhtartó gazda egyrészt az állat, ha ő maga nem járul hozzá a csira fenntartására azon rossz szokás által, hogy a kergékörben levő bányokot levágván fejüket a juhaskutyáknak ételül adja, miáltal a féreg csirája csak fenntartatik; másodszor pedig azáltal, hogy a juhnyájbéli kutyáknál többször — legalább 4-szer egy évben — a galandféreg ölé és hajtó szereket úgy alkalmazza, hogy ilyenkor a kutya egy félre eső rekeszben legyen elzárva és a lerakott bélsár a netalán tartalmazó érett izekkel együtt elégethető és megsemmisíthető lehessen; harmadszor pedig, a mennyire lehet — és ez a legnehezebb — idegen kutyákat a juhnyájtól távol tartani.

Legbiztosabb galandféreg ölé és hajtó szer a kutyánál a kamala, mely szerből egy kutyának 4 grammot 30 gramm vízzel kell beadni és 2 óra múlva 2 evőkanálnyi ricinus olajat.

Ez általános bevezetés után áttérhetek a fentjelzett jelenlegi esetre.

1877. Január 3-án tétetett a jelentés, hogy a kolozsmonostori m. kir. gazdasági tanintézetben levő 3 éves, Hector nevű, műrczvolgyi bika beteg. A kór előzményeire nézve csak annyi tudott, hogy a bika 3 nap oltta nem eszik és időnként rohamos göresöket kap. A beteg bika vizsgálatánál következő körkép találtatott:

Az állat fejével a jászolhoz támaszkodva a megszólításra vagy érintésre nem figyelt, nem evett és nem kérődött, a légzés valamivel siettetett, érverés 94, hőmérsék 39.4° C. a koponya táj melegebb a rendesnél. Ezen tünetekből agylobra kellelt következtetni és így rendeltetett hányborkó közepsókkal és fejre hideg borogatások. Ezen gyógykezelés mellett egyformán tartott a láz és a tünetek nem változtak. Január 6-

án hirtelen megvakult az állat, a nélkül hogy szembaja lett volna, vagy valami rázkódtatásnak lett volna kitéve. A láza nagyobbodva, a napsugárra az iris nem reagált és így fekete hályog vagy látudegbánás fejlődött hirtelen. Ezen tünetből agyvizkórságra tettem a kórismét és egyuttal a jóslatot absolute kedvezőtlennek nyilvánítottam és e miatt azon javaslatot tettem, hogy a bika, mely még jó husban volt a mézárósnak adassék el. Ezen javaslat el nem fogadtatván, a gyógykezelés folytattott, míg az állat január 13-án már annyira elgyengült, hogy a lábán állani nem tudott és e miatt mindig feküdt és pedig csak a jobb oldalon — időnként a görcsös rohamok jelentkeztek, míg az állat január 28-án megdöglött.

A hulla bonczolatilag megvizsgáltatván a következő bonczület találtatott:

A. Külsőleg. A hulla nagyon sovány, mindkét oldalán, de inkább jobbfelől a csiptájon nagyobb kiterjedésű bőrhámlások láthatók.

B. Belsőleg. 1. A hasür megnyitvatván, a belek üresek és vérszegények, különben semmi kóros változás nem észlelhető.

2. A mellürben a jobboldali mellhártya vérbeivodás (imbitio) által sötétpiros színű és vérömlényekkel ellátva; a jobb tüdő szárny egész kiterjedésében sötét és kékes piros színt mutat, felvágás után a vágás lapon sötét vér, nagy mennyiségben léghólyagcsákkal keverve, folyt ki. A bal tüdő szárny halvány és vérszegény.

3. A fej levágásánál a koponyaürből az öreglyukon keresztül kevés sárgás piszkos folyadék folyt ki. A koponyaür kinyitása után a kemény agykér mindkét nagy agy félteke felett megesontosodva, ennek eltávolítása után a jobb nagy agy félteke egész felületén sötétpiros; a pókháló felületén nagykiterjedésű vérömlények láthatók, a bal nagy agy félteke halvány, mindkét nagy agy félteke duzzadt és a felületre gyakorolt nyomásra némi hullámozást lehetett észlelni. Kinyitván a jobb nagy agyfél gyomrocot, nagy mennyiségű tiszta savó ömlött ki (mintegy 90 gramm) az agy gyomroc felső falzatán az agy annyira sorvadt, hogy annak átmérője csak alig 3 mm-nyit tett ki (6.5 mm.) A bal gyomroc megnyitvatván egy nagy, tyuktojás nagyságu tiszta savóval telt hólyag találtatott. A hólyag kivételén és felvágatván, annak folyadékában, valamint annak belső falzatán kiszámíthatatlan mennyiségű gombostü mekkoraságu fejek, szemcsék — scolex — voltak láthatók és ámbár a hólyag alakjáról és a számtalan scolexből a talált hólyagot coenurus cerebralesnak lehetett felismerni; mégis biztosabb meghatározás végett állattani tanár Dr. Szaniszló ur vezetése alatt, rögtön megejtetett a görcsövi vizsgálat, mely vizsgálatnál a 4 szopó szervvel és chitin horgokból álló koszorúval ellátott jövendőbeli Taenia coenurus fejét, vagyis scolexét — dajka — igen szépen lehetett látni. **Dr. Mina János.**

Ha azt akarjuk, hogy teremjenek, gondozni kell a réteket is!

Mily öröm még csak vissza is emlékezni azokra a zöldbáronyszerűn tömött gyepűrétekre, a melyeket a badeni nagy-

herczegségben és a Schweitzban jártamban alkalmam volt láthatni; melyeknek üde zöld színét alig zavarja meg itt-ott oda tévedten egy-egy virág, vagy egy-egy leveleivel szélesen elterjeszkedő réti gyom. Igen ám, mert a badeni és schweitzzi gazdák azt tartják, hogy a virágnak a virágos kertben és az erdők ligeteiben a helye, a hol a nélkül gyönyörködtetnek, hogy kárt tennének, a gyomot meg nem csak a mezőn, de a réteken se szabad tűrni, ha azt akarjuk, hogy azok gyökereikkel a tápot, leveleikkel meg a napsugarat el ne vegyék jövendelő növényeink elől.

De künn is találjuk Badenben és Schweitzban tavasszal egész családjával a gazdát a réten és ki késsel, ki aszatírtó ásócskával árt az ellenségnek, a hogy tud. Minden oly növény, a mely nem a pázsit- vagy löherfélékhez tartozik, minden irgalom nélkül ki lesz irtva, de ad is aztán az ily rétet oly finom szénát, hogy öröm a gazda szemének még csak reá nézni is.

Most lássuk az érem másik oldalát! Ha nálunk tavasszal a legtöbb réten végig nézünk, azt hisszük, hogy valami virágos kertbe tévedtünk, annyi rajta a szebbnél szebb, tarkábbnál tarkább virág, melyek között azután még, hogy a színhatás annál nagyobb legyen, sűrűn pompáznak a majd világosabb, majd sötétebb zöld nagylevelű gyomok. Mintha csak egy kertész művészi keze rakta volna össze, hogy gyönyörködjék rajta a szem.

Hanem azután, mikor eljön a kaszálás ideje, akkorra a virágoknak már csak a kőrója áll a kasza előtt és a gyomok terebélyes levelei mellett csak félénken kandikál elő egy két szál füvecské. S az eredmény: holdanként egy szekér — még csak nem is széna — hanem kőró! —

De talán mégis tévedtem, hiszen nálunk is láthatni báronyszerű szép zöld réteket is, legalább a távolból úgy tünnek fel, mintha ilyenek volnának, de ha közelebb jutunk, látjuk, hogy az egész csak láttani csalódás volt, mert a zöld szín sárgás zöldbe megy át s a távolból tömött gyepvel borítottnak hitt felszint, sivar mohhal látjuk ellepve.

No de térjünk a tárgy érdemére.

Ha azt akarjuk, hogy réteink sok és jó szénát adjanak, ki kell azokról pusztítani nem csak a füvektől a tápot s a világosságot elfogó s ennél fogva a réti füveknek halálos ellenségét képező terebélyes levelű gyomokat, hanem még a kaszálásig csupán kőrokat adó ajkas és szegfűféle virágu növényeket is s e mellett, a hol vízzel rendelkezik a gazda, bocsássa reá azt réti rétegre, a hol pedig sok a talajban a víz s ennél fogva a sásféle növények lepték el a rétet, ott meg igyekezzék nyitott árkok által elvezetni abból a felesleges nedvességet. Mindkét iránybani munkája okvetlenül bőven meg lesz már az első években jutalmazva.

Hol pedig a rétek a talaj tulságos szárazságánál fogva nem adnak aránylagos termést, fel kell azokat törni s bevetni takarmányfélékkel. S a mohos réteket végre, hogyha azok a tulságos nedvesség folytán mohosodtak el, legelőbb is ki kell száritani, azután jó sűrű s apró fogu boronával, vagy pedig vasgereblyével kell a mohot kiszedve belőle bepergetni a talajnak megfelelő fűmagvakkal és ha ki nem nevetnének örette (mert

hiszen nálunk még a szántóföldekre se jut elég trágya) ide irnám azt is, hogy hintsük meg azt jó apró földdel elegyes trágyával is.

Hanem hogy e tanácsot követni is képes legyen a gazda, elmondom, hogy hogyan készíthet magának jó rétre való földtrágyát a nélkül, hogy azt szántóföldjétől legyen kénytelen elvonni. Mikor a juh- vagy marhaakolból kihordta a trágyát, mielőtt újra bealmozná, borítsa meg annak az alját vagy egy jó arasznyira valami porhanyóbb természetű földdel és mire újra kihordatta az akolból a trágyát, e felhordott föld a legjobb rétrágyává válik a trágyalével és gőzzel való átítatás folytán és ezenkívül söprese össze udvarát minden szombaton és ezt a söpredéket is összegyűjtve hordassa ki a réjére. Lehet tehát a rétszámára trágyát állítani elő, csak akarjuk.

Ha pedig száraz elmohosodott rétekekkel van dolgunk, itt más segítség nincs, — mert az ily rétek a kimerültség folytán mohosodtak el, — mint feltörve, azokat felületesen megtrágyázni s néhány évi kapás növények alá való használat után lóher, bal-taczim vagy luczernával bevetni.

Kodolányi Antal.

A nemes fűz dugványozásáról.

Ha a fűzesnek földje kellőleg megműveltetett, a dugványok megválasztását kell megtenni, a hol legfőbb igyekezetünket a jó faj megválasztására irányozzuk, mivel a jó faj több termést és hasznot hajt, mint a rossz.

A leggyakrabban és legnagyobb sikerrel termeltetni szokott fajok a következők:

1. *Salix vitelina aurea*, arany fűz. Minden nemű kosármunkákra, különösen pedig szőlő felkötözésére szokott használni.

2. *Salix viminalis cannabina*, kenderfűz. Durvább kosármunkákra és fa abrancsoknak használják.

3. *Salix uralensis caspica*, sárga fűz. Finomabb kosármunkákra használják.

4. *Salix japonica*, japáni fűz. Finomabb munkák készítése és szőlő kötözésére használják.

5. *Salix viminalis bataviae*, bataviai fűz. Durvább munkák fonására szokták használni.

6. *Salix sericea*, selyemfűz. Igen finom munkák készítése és díszítésre használják.

7. *Salix laurina*, babérlevelű fűz. Kiválólag díszítésre használják.

Mind ezen fennemlített fajok a kolozs-monostori m. kir. gazdasági tanintézet kertészétől jutányos áron beszerezhetők. —

Ha a föld kellő előkészítését és a dugványok megválasztását bevégeztük, következik a dugványozás. Mielőtt azonban a dugványozást megkezdenénk, egyik főteendőnk a sorok meghatározása a különböző fajok szerint. Erősebb növésű kosárfűz fajoknál a sorok egymástól távolsága 1 meter; a gyengébb növésűeknél pedig 75 cm. és végre pedig az egyes dugványok hossza az erősebb növésű fajoknál 30—40 cm., a gyengébb növésűeknél pedig 30—33 cm.

Ha a sorok és a dugványok egymástól távolsága meg van határozva, az egyes dugványok leszurása következik.

A dugványozás idejét az időjárás határozza meg. Ha az időjárás és a föld fagyának felengedése enged, azt mentől előbb, még pedig martius és aprilisben kell megejtenünk. Mert minél korábban történik a dugványozás, annál jobb. A késői dugványozásnak azon nagy hátránya van, hogy az későn hajt ki és hogy hajtásai az első évben kellőleg meg nem erősödhetnek.

A dugványozás a következő módon történik: az előbb meghatározott hosszúságra metszett dugványok kosarakba rakatnak és munkások által a már kijelölt ültetési vonal irányában a huzott zsinag hosszában, az egyes dugványok a földbe szuratnak és ha szükséges, lábball lenyomatnak. Szükséges a dugványozásnál ügyelni arra is, hogy az egyes, a földbe lerakott dugványok a földből 2—2½ cm-nyi magásra kiálljanak, mert különben az erős esőzések alkalmával a dugványok könnyen egészen eltemetnek, miáltal a dugványoknak nagyobb része az őket fedő földrétegen keresztül nem hatolhatván, ki sem hajt. A dugványozásnál ügyelni kell továbbá arra is, hogy az egyes dugványok rügyeikkel felfelé állva szurassanak be a földbe, mire már a kosarakba rakásnál ügyelni kell.

Nem lényeges, de igen czélszerű ott a hol lehetséges, a sorok irányát délkeletről északnyugatnak vinni, mivel ekkor a jótévő reggeli nap melege a sorok közé jobban behatolván, a déli nap melege pedig nem fogja oly könnyen a talajt kiszáradni, miután az egyik sor a másikat, illetőleg a földet beárnyékolja.

A báró Babó által szerkesztett „Weinlaube“ című folyóiratban a szerkesztő a következő dugványozási módot ajánlja.

A fűz vesszőt hosszában, a már megrigolirozott földben 2—3 cm. mélyen leássuk. Az ilyen ültetési móddal érjük el azt, hogy egyenes fűz vesszőket fogunk nevelni.

Ezen, báró Babó által leirt igen czélszerű és könnyű ültetési módot bárkinek is lehet ajánlani.

Az itt fentebb érintett és tárgyalt fűztenyésztési munkálatok után egy igen fontos teendő van még hátra — a művelés.

Az ebbeli főbb munkálatok 3 évre terjednek ki.

Az első évbeni teendő, a fűztelepet tisztán tartani, a mire nézve legczélszerűbb a sorok között kapásnövényeket tenyészteni; a miáltal elérjük azt, hogy a kapásnövények megművelése által, a talajt és sorközöket tisztán és porhanyóan tartjuk, mely melléknövények tenyésztése által a fűztelepeinkre fordított költségből valami visszatérül.

A második évbeni teendőnk, ujólag a talajt tisztán és porhanyóan tartásából áll, az első évben a sorok között tenyésztett kapásnövényeket itt ujólag vethetjük. További teendőnk ez évben, tavasszal a fűz vesszőknek 1—2 szemei visszametszéséből áll.

A harmadik évben már a fűzbokrok annyira megerősödtek és sűrűsödtek, hogy a sorok között többé kapásnövényeket vetni nem lehet, de azért mégis szükséges a sorok közt tisztán és porhanyóan tartani, a mi egyszeri kapálásból állhat.

A további évekenbeli művelés abból állhat, hogy a fűzvesz-
szőket minden évben levágjuk és értékesítjük és még, ha szük-
séges, a talaj tisztán tartása és porhanyítására gondot fordítunk.

A fűzművelés mellékteendőiről u. m. a káros befolyások
elleni óvintézkedések, a fűztelepek ápolása, a fűzveszők vágá-
sa, az ültetvények tartama, a fűz telepek trágyázása és végül a
vesszők értékesítéséről egy közelebbi alkalommal fogunk
megemlékezni.

Enyedi.

Uj szaklapok.

„Haladó gazda“ czimen lapunk n. t. munkatársa és
a kolozs-monostori m. kir. gazd. tanintézet volt igazgatója, je-
lenleg komárommegyei vándortanár Molnár Lajos folyó
évi mártius hó 20-ától kezdve népszerű lapot ad ki, melynek
első száma több nagyon talpraesett gyakorlati cikket közöl a
szerkesztő ismert, kedvelt és jeles tollából. A lap havonként két-
szer jelenik meg, előfizetési ára 3 ft.

„Gazdasági mérnök“ czimen majus 1-étől kezdve
Gonda Béla a földöntözés, csatornázás és folyószabályozás,
valamint a mezőgazdasági gépészet és építészet köréből nép-
szerű folyóiratot fog kiadni, megjelenik havonként kétszer, raj-
zokkal ellátva, előfizetési ár a jelen csonka évre 4 ft.

Értesítés.

A debreczeni m. kir. gazdasági taninté-
zet igazgatósága figyelmezteti az azon intézetből kike-
rült ifju gazdákat, hogy ha állomásukat változtatni ohajtják,
hozzák tudomására az igazgatóságnak, mert igen gyakran van
az intézet azon szerencsés helyzeiben, hogy jó állomásokra,
volt tanítványai után tudakozódnak, de oda nem mindig tud al-
kalmassal ajánlani.

Áprilishavi közmondások.

- Az áprilisi idő és az asszonyok gondolkodása ingatag.
Hüvös április, sok szénával és gabonával jár.
Meleg április, hüvös május, esős június megtölti a magtárt és
szénakazlakat rak.
Esős április után, száraz június következik.
Ha áprilisben menydörög, nem lesz többet dér.
Minél korábban virágozik a kőkény, annál korábban aratunk.
Az áprilisi fűvet gyakran lezövekel a május.
Sz.-György táján vetett zab, sok polyvát terem.
Ha Sz.-György napkor a varju kilátszik a buzából, akkor ne
várj jó termést.
Ha Sz.-György nap előtt kuruttyolnak a békák, akkor Sz.-
György nap után elhallgatnak.
Ha április utolsó nap éjjelén esik, termékeny esztendőre van
kilátás, de cseresnye kevés terem.

Ébner Sándor.

Vidéki gazdasági tudósítások.

Tüvis. 1877. martius 24-én.

A tél általán szelid folyásu volt, a tavasz elég korán bekö-
szöntött és oly idő uralg, hogy a legrestebbet is habár akaratlanul
munkára készíti, nem is resteskedik senki, mert a jól mivelhető ta-
lajon szeltében hosszában foly a szántás és pedig első ízben buzát,
rozsot stb. fognak vetni, eddig azonban még mag a talajba nem ke-

rült. Őszi vetésről nem szólhatunk, mert a tagosítás hátrányos, illető-
leg rossz keresztülvitele miatt ugyszólván senki sem vetett és így egy
helytelen vagyis rosszul megejtett munkának eredménye az lett, hogy
ezen község 30—40000 ft. kár: szenvedett. Takarmány bőven van.
házi állataink jó egészségnek örvendenek, árúk azonban nagy, ugy-
szintén az őszi gabonáé, ennek oka az, hogy mint már említém ősz-
kor senki sem vetett. A juhok ellése nagyobb részt most történik,
ellési százalék 76—77%. Legelők, rétek jó karban vannak, szőlők ki-
tünően telettek, ugyszintén a gyümölcsfák. **Rösler Károly.**

Földvár-Hidvég, 1877. martius 24-én.

Nálunk a tél nagyon lanyhán folyt le, nagyobb részt esővel és
nagy: sárral, mely a trágyázást nagyon hátráltatta. A martius elseji
nagy havat és hideget csakhamar jó idő váltotta fel, úgy hogy a ta-
vaszi vetést martius 22-én zabbal megkezdhetjük és azóta folytathat-
juk. Földeink nagyon jól számlanak, őszi vetéseink kitünően telettek,
takarmányunk nagyon szűk és drága. Az Olt vize nagyon megáradt és
a réteket mind elöntötte, de ez Szent-György nap előtt csak hasznukra
vált. A gabona ára igen felment, de most egy keveset szállott, az állatok
ára mérsékelte, betegség köztük nem mutatkozik. Martius 24-ére virra-
dóra nagy zivatarunk volt, erős villámlással és mennydörgéssel.
Konya Miklós.

Vingárd, 1877. martius 24-én.

A mult év őszi és téli szakának tulságos nedvessége következté-
ben a juhnyájak fiatalosai szőrfelegben nagyon pusztultak, e mellett
még a rüh is fellépett. Többi állataink jól telettek, az őszi vetések —
kivált a későiek — nagyon jók és szépek, a korábbiak az egerektől
sokat szenvedtek, még pedig hegyen többet, mint lapályon, hol az
egerek inkább pusztultak. A tavaszi munkálatok a talaj tulnedvessége
miatt késnek, mely késedelem még fokozódik az által, hogy a Maros,
kivált Enyed vidékén nagy áradásokat okozott; melyek az őszi vetést
és a tavaszi alá eső szántókat is elborították.

Kozma Gyula.

Székely-Keresztur vidéke, 1877. martius 23-án.

Rendkívül enyhe telünk december és januárhóban sok esőve
járt; takarmány készletünk alig lesz elég a tavaszi szántás idejére,
ámbar a juhok december és januárban legelőre jártak. Őszi vetése-
inket leginkább az egér rontotta, a korán végzett vetések nagyon szé-
pek. Tavaszi munkánk martius 22-én verőfényes oldalos helyeken zab-
vetéssel vette kezdetét. A rétek és legelők most ujulnak, 20-ika óta
a juhok kijárnak. A juhok kielégítően diszlenek, halálözési százalék
átlagban 3%, ellési százalékuk körülbelül 95%, a lovak és szarvas-
marhák ellése jobbára most kezdődik. A mult tavaszi árakhoz képest
a szarvasmarhák ára 15—20%, a gabonák ára 60—80%, a széna ára
25—30%-kal emelkedett, minek okát valószínűleg a keleti politikai
viszonyokban kereshetjük. Vidékünkön egy „kerti mag termelő egyeslet“
van alakulóban, melynek alapszabály tervezetét alkalmmal ismertetni
fogjuk. **Szentkirályi Árpád.**

Mocs, 1877. martius 26-án.

A tél sárral telt, igás dolgot keveset lehetett végezni, takar-
mány volt bőven, de táperő nélküli, maradt is belőle elég. Minden
állat nagyon gyenge, a juhok mételyben hullanak, a bárányok gyen-
gék. Rózsunk fele részben kipusztult, a buzák szépen telettek, gyü-
mölcsfák sokat ígérnek. A marhák ára nagy, de kelendőségük gyér.
Nagy József.

Egerpatak, 1877. martius 25-én.

A tél szeliden folyt le, takarmány készlet a szükséghez képest
megfelelő mennyiségű, közép minőségű, az őszi vetések jól állanak, a
tavasz szép verőfényes napokkal kezdődött, maga a munka e hó 20-

án; 23-án volt az első zabvetés. Rétek és legelők jó karban vannak, gyümölcsfák jól teleltek, gazdasági házi állatok szépen diszlenek, az ellés általi szaporodás kielégítő. A termények ára múlt évi termék-lenség miatt gyorsan emelkedik, az állatok ára közepes. A lentermelés és kikészítés ügyében tartott vándortanítás élénk érdekeltségre talált, sokan készülnek termelési kísérletet tenni.

Márk István.

Toroczkó, 1877. mártius 26-án.

Vidékünkön a tavasz csak mártius 18-án mutatkozott, verőfényes helyen zabot 20-án, tavaszi búzát 26-án vetettünk. Marháink nem a legjobb állapotban vannak, juhainkat nagyon keresik, takarmányunk nem sok maradt. Az őszi buza, kivéve az egér pusztítást, nagyon szép és jó eredménnyel bíztat, réteink nyirkosak, de ily idő mellett csakhamar felszáradnak, a gyümölcsfák riügyeznek, az eper virágzik, a somfa kivirágzott. A gabona ára növekszik.

Zsakó János.

Radnót, 1877. mártius 27-én.

Telünk november elején nagy hideggel és hóval kezdődött, mely decemberben elolvadt, azóta sárban uszunk. Takarmányban nincs hiány, de a sok eső verte széna hatása a jól gondozott állaton is meglátszik. Őszi vetéseink szépek, jól teleltek, tavaszi munkát mártius 27-én takarmány, répa és zabvetéssel kezdtünk, réteinket és legelőinket víz borítja. Fiatalabb gyümölcsfáink patkányragás miatt kihányandók, a szőlők jól teleltek. Állataink ellési szaporulata teljesen kielégítő. Buza, rozs, árpa és zabnak jó ára van, valamint a szarvasmarhának is, ezen utóbbinak okát a megfogyott marha létszám és a községi tenyészbírák hiányában lehet feltalálni.

Márkos Ferencz.

Kendi-Lóna, 1877. mártius 27-én.

Telünk november közepén állva be, pár hideg hét kivételével sáros, nedvesen folyt le, a mi a felette elszaporodott egereket elpusztította. Repce, őszi buza és rozs vízmentes helyeken jól teleltek és szépen bokrosodnak, a tavaszi munkát 24-én őszzel felszántott táblákban árpával kezdtük. Réteink alig, szénafüveink épen nem érzik még a tavaszt, ellenben verőfényes legelőink már legelész a meddő juh. Szőlő, gyümölcsfa jól telelt. A lábasszág egészséges, jól telelt, az ellési szaporulat teljese kielégítő, takarmánykészletünk csak épen hogy elég lesz. A gabona ára csökken, a jó ökör és lónak vidéki piacainkon megkérlik az árát. Utaink sok ideig járatlanok voltak és még most is infamis rosszak, jó volna, ha a szolgabírói erélyből nem csak adóbehajtásra, hanem utcsinálásra is jutna valami

Horváth Bertalan.

Cserhalomtáj, 1877. mártius 27-én.

A most lefolytnál czudarabb telünk rég nem volt. Hó és szánut helyett örökös locs és sártengert láttunk. Fáizni kinnal, trágyázni épen nem lehetett. Takarmány készletünk még van. Őszvetéseink szépen teleltek. A tavaszi szántást tegnap kezdtük meg kertjeink szántásával s az oldalokon zabvetéssel. Ha a csütörtöki 24^o R. szerinti meleg és rája dörgés, villámlás s egész éjjeli esőzés nem következik be, mi rég nem látott áradatba hozta folyóinkat, már múlt pénteken és szombaton kimchett volna az eke. Az ifju ültetésű szőlők megért venyigeje jól telelt; terméssel bíztat. A gyümölcsfák is telvék virágrügygyel, a kaj-szin baraczk virágrügyye piroslik. Házi állataink egészségesek, csak juh veszett el nagyon sok a métely miatt. A marha ára emelkedett. A gabona ára is jó. A zab drága vetni.

Vályi Elek.

Szerkesztői üzenet.

„Mezőségünk némely részének gazdasági viszonya“ valamint „A juh haszna és ellése“ című cikkek nem ütnek meg a mértéket.

„A marhavész orvosságáról“ irt cikk, mint minden alapot nélkülöző nem közölhető.

Piaczi árainkat illetőleg

megjegyezzük, hogy Beszterce, Cs.-Szereda, Déva, Fogaras, és V.-Hunyad újabb heti vásáraitól tudósítást nem vetünk, a dévai gabnaárak 100 kilogrammonként vannak jegyezve. — A hectoliter árának átszámítása a régi mértékre nagyon egyszerű: az összeg egy tizedrészét leütve, a maradék gyakorlat igényeihez képest elég pontosan három véka árának felel meg. P.o. buza hectoliterje 800 kr., leütve a tizedrészt, 80 krt, marad 720. kr., mint három véka, tehát 240 kr., mint egy vékának ára!

Felelős szerkesztő: GAMAUF VILMOS.

Hirdetések.

Felszólítás a t. cz. gazdaközönséghez!

Alírott tisztelettel felkérek mindenkit, a kinek gazdasági magvai, u. m. luczerna, lóher, muhar, búkköny, lenmag, lencse, horszó, kerti vagy mezei paszuly, mák, kanadai zab, kendermag vagy bármiféle más gazdasági magvai eladók, vagy pedig eladás végett bízományba adandók volnának, méltóztassanak engem személyesen felkeresni, vagy minta beküldése mellett levélben értesíteni.

(9)10-12 **CSIKY IMRE**, fűszer-, mag- és ásványvíz-kereskedő. Kolozsvárt.

Jelzálogkölcsonőket

a birodalom bármely részében, telekkönyvezett nem tehermentes földbirtokra 1000 frttól a legmagasabb összegig 5% és 6% kamat mellett törlesztésre, rövid idő alatt és 5000 frton felülieket még előnyösebb módozatok mellett gyorsan eszközöl, bővebb felvilágosítással készséggel szolgál.

a hatóságilag engedélyezett általános


(3) (7-26) „Ipar és keskedelmi ügynöki iroda“

Kolozsvárt, párisutca, 19. sz. saját ház.

(Értekezhetni személyesen vagy posta útján naponta d. u. 1-4 óráig)

Gazdákat érdeklő!

A jó szecska-vágó gépet a mostanihoz hasonló esztendőben nélkülözni nem lehet. Az ilyenmü emberi erőre szerkesztett gépek közül, mint legjobbat



Weil új szerkezetét halljuk említeni, mely óránként 300 kilot vág és bizonyos tekintetben fölülmulhatlanul áll.

Érdeklődőket ifjabb WEIL MÓR gépgyárához

Bécs Franzensbrückenstrasse 13 sz. utaljuk,

(4.)

(5-8)

Eladó szőlővessző.

80,000 darab rajnai riesling sima vessző ezere 6 frt. (21.) (1-3.)

Kapható báró Szentkereszty Györgynél Hosszuaszó u. p. Balásfalva.

Eladó szőlővessző.

Az erdélyi gazdasági egyesület titkári hivatalánál Kolozsvártt még néhány ezer gyökeres és sima **rajnai riesling, traminer, oporto és pinot noir** szőlővessző rendelhető, ára a sima vessző ezerének 5 frt, a gyökeres ezerének 20 frt.

(23.) (1-3.) **Gamauf Vilmos,**
egyleti titkár.

A tófalvi szőlő iskolában

(22.) **eladó:** (1-4)

100 000 gyökeres riesling szőlő vessző 20 frtba számítva

100,000 sima riesling szőlő vessző melynek ezere

1-ső osztályu 10 frtba

2-ik osztályu 5 frtba számítatik.

Csomagolás a legjobban és ingyen történik.

A tófalvi szőlő felügyelője,

Hauzinger József.

TAUFFER FERENCZ
magkereskedő Kolozsvártt,
ajánl vetőmagul:
hópehely, fehér rózsza, Extra Early Vermont és Early Rose **burgonyákat**, valódi oberndörffi sárga takarmány **répa magot**, melyből kívánatra **mintául** répákkal szolgálók, továbbá nagy választékú gazdasági, kerti és virágmagvakat, **Pignoletto** törökbúzáat, Saynor- és Cook-féle angol kertész **késeket** és ásókat.

Árjegyzékek ingyen és bérmentve szolgáltatnak ki.

(1.)

(13-52)

Piaczi árak.

A heti vásár		Egy hectoliter (=70 kupa)						100 kilo		1 köbméter	1 kilo
helye	napja	tiszta buza	elegy buza	rozs	árpa	zab	törökbúza	széna	szalma	tüzipfa	marhahús
á r a k r a j o z s á r o k b a n											
Beszterce	febr. 6.	950	850	460	—	230	325	230	110	320	28
Brassó	mart. 23.	1000	775	615	450	275	450	205	100	360	36
Csik-Szereda	febr. 28.	1000	825	650	500	250	500	400	180	125	24
Décs	mart. 27.	900	840	555	—	240	300	520	155	200	32
Déva	mart. 17.	1000	900	840	600	740	650	420	180	220	32
Erzsébetváros	mart. 24.	800	650	580	—	320	375	300	140	300	36
Fogaras	dec. 14.	775	670	450	450	200	425	140	30	—	24
K.-Fehérvár	mart. 24.	890	760	600	—	—	400	350	170	300	36
Gy.-Sz.-Miklós	mart. 24.	900	650	575	550	275	475	110	25	—	28
Kolozsvár	mart. 29.	1000	600	580	—	320	400	280	170	360	38
M.-Vásárhely	mart. 22.	870	650	670	300	330	350	280	60	380	34
Naszód	mart. 22.	1000	800	600	265	235	400	250	80	250	24
Nagy-Enyed	mart. 22.	925	750	550	—	326	400	330	30	235	36
N.-Bzeben	mart. 27.	890	750	580	560	270	410	210	120	350	40
Segesvár	mart. 22.	880	680	600	—	300	410	140	80	200	36
S.-Sz.-György	mart. 26.	920	800	560	460	290	460	250	150	250	28
Szamosújvár	mart. 26.	885	585	590	—	255	390	350	75	500	34
Sz.-Régen	mart. 22.	870	645	645	352	260	493	300	140	280	34
Sz.-Údvárhely	mart. 20.	1050	800	750	—	350	450	200	40	200	36
Torda	mart. 24.	1050	800	550	600	300	350	360	40	300	36
V.-Hunyad	febr. 10.	800	600	540	—	250	480	200	100	300	36

Mellékletek

100 darabonként 1 forint 40 krjával számítatnak.

A hirdetés szövegét a t. megrendelők minden külön díj nélkül természetesen szerint akarhányszor változtathatják.

Az „Erdélyi gazda“ hirdetési díjszabályzata.

A kívánt tér megnevezése	1 1-3 1-6 1-12 1-18 1-24 1-30 1-36 1-42 1-52									
	széri hirdetésnél									
	f o r i n t									
1/16 v. egész oldal	12	33	64	120	170	216	260	290	320	360
3/16 v. fél „	6	17	32	60	90	110	130	150	160	180
1/4 v. negyed „	4	9	16	30	45	55	65	75	80	90
2/16 v. nyolczad oldal	3	5	9	16	24	30	35	40	45	50
1/16 v. tizenhatod „	2	3	5	9	15	18	20	23	25	27

Ezenkívül 30 kr. bélyegdíj annyiszor, a hányszor a hirdetés megjelenik.

Egyletünk t. tagjai és

lapunk t. előfizetői

25% vagyis egy negyedrészes engedményben részesülnek, ha hirdetésük beküldésekor tagsági vagy előfizetői minőségükre hivatkoznak.