


ERDÉLYI GAZDA

AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI EGYLET



KÖZLÖNYE.

Megjelenik minden pénteken egy iven és az egyleti tagoknak ingyen küldetik meg.

Nem tagok egész évre 4 frt, félévre 2 frttal fizethetnek elő, negyedéves előfizetés el nem fogadtatik.

Pénz- és értékküldemények az ERDÉLYI GAZDA KIADÓ-HIVATALÁHOZ (Dr. Hintz György, e. pénztárnokhoz), a lap szellemi részét illető közlemények az ERDÉLYI GAZDA SZERKESZTŐSÉGÉHEZ (Gamauf Vilmos, e. titkárhoz) címzendők.

A hirdetési díjszabályzatot lásd az utolsó lapon

Szerkesztő bizottság: elnök **Paget János**; **Berde Áron**, **Szabó Samu**, **Szentgyörgyi József**, **Vörös Sándor**, felelős szerkesztő: **Gamauf Vilmos**.

Tartalom: Óriási törökbuza. — Faiskola felosztása. Gábor József. — A repcze. Walter Lajos. — A víz szerepe az állati bel-gyógyászatban. Sárosi Pál. — A madarak haszna. P. I. — Az erdőörvényjavaslat. — Vidéki gabona és borvicsár. — Rövid utasítás községi faiskolák céljai és hasznairól. — (Könyvismertetés.) — Vidéki gazdasági tudósítások: Mocs, Földvár-Hídvég, Szász-Fenes, Küküllővár, Sepsi-Sz.-György, Szász-Régen, Magyar-Igen. — Piaczi árak. — Hirdetések.

Óriási törökbuza.

Az óriási törökbuza vagy amerikai Caragua-tengerit a francia szaklapok újabb időben mint mennyiségileg legjobban fizető takarmánynövényt magasztalják.

Néhány évvel ezelőtt Délamerikába indult olasz kivándorlók Limido vidékén a comói járásban meghonosították és mint takarmánynövényt kiváló gondnal termesztették; főleg azért, mert a szarvasmarhának nagy mennyiségben szolgáltat kedvelt takarmányt, mely tél elejéig zöld marad.

Ezen új növénynek meghonosítói teljesen empirice jártak el, sőt még nevét sem tudták. A „L' Italia agricola”-című milánói jeles szaklap szerkesztőségének érdeme, hogy már 1875 óta a törökbuza tudományos kísérleteknek lett alávetve. A kísérletek több helyt egyszerre eszközöltettek, még pedig homokos száraz; agyagos kötött száraz, meszes és nedves talajban. Az eredmény a következő: a szerint, a mint az óriási törökbuza takarmánynak, vagy magnak volt szánva, az első esetben úgy volt vetve, mint a közönséges takarmánytengeri; magnak azonban 0.6 meternyi távolságra sorban vetve, trágyázva és szokás szerint kapálva, töltögetve. Már 4—5 nap alatt a csirázás véghez ment, rövid idő alatt elérte az óriási törökbuza a három héttel előbb vetett közönséges tengeri magasságát, sőt azt nemsokára meg is haladta. Az egyes növény példányok nagyon szépen fejlődtek, az átlagos magasság 4 metert, sőt némely vidéken 5 metert tett, a szár vastagsága föld felett 0.17 meter

volt. A száron több eső, egészen hétig a legszebben fejlődött és mindannyi meg is érett.

A szem az eredetileg vetetthez hasonlítot ugyan, de nem volt szép, mert színe fehér és alakja nagyon ellapult és vékony volt. Liszté örölve az óriási törökbuza kevesebb korpát adott, mint a közönséges és azt hiszik, hogy ennél fogva sertésnek és baromfinak alkalmasabb tápul szolgálhat. A takarmáynak szánt óriási törökbuza valamivel csekélyebb magasságot ért el, mint a magnak való, azonban szára föld felett csakis 0.10 meter vastagságot mutatott. Lombja nagyon buja és leves, a szarvasmarha nagyon mohón fogyasztja, talán azért, mert szára puha, szivacsos és édesizű nedvben bővelkedik, melyet a marha nagyon szeret.

Ezen kísérletekből kitűnik, hogy az óriási törökbuza a buza aratása után kell elvetnünk, ha jó és bőséges takarmányt akarunk belőle nyerni. E vetés annál inkább megfizeti a reáfordított munkát, mert az óriási törökbuza a szokásos besavanyítás útján télire is eltehető. Az olasz kísérlettevő e tekintetben következőleg járt el: a levágott szár néhány napi hervasztás után körülbelül 3 centimernyi darabokra aprózva, 2 meter hosszú, 1.1 meter mély falazott gödörben eltömött. Felül egy réteg szalma és buza polyva hintetett, erre pedig kövel lenyomatott deszkát helyezett, hogy a levegő behatása megakadályoztassék. A december 9-én kinyitott gödörben a takarmány ép és puha, de ecetszagú volt, miért is ökor, tehát, borju eleintén egyaránt vonakodott azt elfogyasztani. Azonban néhány óra múlva ez idegenkedés teljesen megszűnt és az állatok nagy étvágygyal mohón ették a hamar megszokott takarmányt. A tulságos savanyodás elkerülése végett ajánlatos a hervasztott szárat rétegenként kevés sóval behintett szalma közé helyezni, az egészet alomszalmával eltakarni és a gödört földdel jól befedni. Ely eljárás mellett télen kiváló leves takarmánnyal fogunk rendelkezni, mely csakis első erjedése kellemes szagával fog birni és állataink által is rögtön megkedveltetni. —

Faiskola felosztása.

A faiskola, ha lehetséges, egyenoldalu négyszögbe hasítható ki, hogy egyenlő nagy és szabályos táblákra osztathassék be.

És hogy az évi fordák rendszeresen megtartathassanak, czélszerű a félholdnyi faiskolát is 10 egyenlő táblára osztani be, mivel 5 éves almár ojtvány nevelésénél ha minden évben csak egy táblát is nemesítünk, még is az öt évi nemesítésnek 5 tábla szükségeltetik.


Egy fél táblába minden évben mag vettetik és ezen magoncok még egy évig való nevelésére ismét egy tábla szükséges, 3 tábla a csontár gyümölcsöknek hagyatnak, mivel azoknak három évi iskoláztatás elegendő a kiültetésig.

Ha pedig ezekből is akarnánk magas dereku korona fákat is nevelni, akkor ez utóbbiak is az öt évi iskoláztatás alá kerülnek.

A megmaradt fél táblában bokor gyümölcsök szaporíthatók és az öt éves nevelés után kiszedett és nem kelt gyengébb ojtványok ültetnek át még egy évi nevelésre. Tájékozással szükségesnek látom azon rendet felsorolni, mely szerint egy ujonnan betelepítendő faiskolánál az évi teendők előfordulnak.

Év	Tábla	Faiskola fordá
1	I.	Fél táblába almár magvak vettettek és szőlő, ribizke, köszméte és málna dugványok dugványoztatnak.
"	II.	Csontár gyümölcs magvak vettettek és ezek azon nyáron helyben beszemeztettek.
2	I.	Az egy éves magoncok és a bogyar csemeték kiszedettek és a tábla újból bevettetik és dugványoztatik.
"	III.	Az egy éves almár magoncok ritkábban beültetnek.
"	IV.	Csontár gyümölcs magvak vettettek.
3	I.	A múlt évi munka ismétlődik.
"	III.	A két éves almár magoncok kiszedettek és egy évesekkel újból beültetnek.
"	V.	Csontár gyümölcs magvakkal bevettetik.
"	VI.	Almár nemesítésekkel beültetnek.
4	I.	A múlt évi munka ismétlődik.
"	III.	A múlt évi munka ismétlődik.
"	II.	A három éves csontár csemeték kiszedettek és csontár maggal újból bevettetik.
"	VII.	Almár nemesítésekkel beültetnek.
5	I.	A múlt évi munka ismétlődik.
"	III.	A múlt évi munka ismétlődik.
"	IV.	A három éves csontár csemeték kiszedettek és csontár maggal újból bevettetik.
"	VIII.	Almár nemesítésekkel beültetnek.
6	I.	A múlt évi munka ismétlődik.
"	III.	A múlt évi munka ismétlődik.
"	V.	A három éves csontár csemeték kiszedettek és csontár maggal újból bevettetik.
"	IX.	Alma nemesítésekkel beültetnek.
7	I.	A múlt évi munka ismétlődik.
"	III.	A múlt évi munka ismétlődik.
"	II.	A három éves csontár csemeték kiszedettek és helyükbe almár nemesítések ültetnek.
"	X.	Csontár gyümölcs maggal bevettetik.
"	VI.	Az öt éves almár ojtványok kiszedettek és utána való évben a tábla üresen marad.

Faiskola tervrajza.



1" = 10 meter.

Az öt éves alrnár ojtóványok rendszerként való kiszedése után mindenik tábla egy-egy évig üresen marad, miáltal a föld újból felforgattatik és ha szükséges lenne még a forgatás előtt meg is trágyáztatik.

A közelebbi őszen az almár magvetés és a bokor gyümölcsök dugványozása ezen hevert táblába költözik át, és a volt magoncztáblába csontár magvak vettetnek, a másodsor kiürített csontár táblába pedig almár ojtóványok ültetnek be.

Ily módon elérve lesz az is, hogy egy táblába nem mindig ugyanaz a faj gyümölcsfák neveltetnek, hanem felváltva az almárok után csontárok és ezek után ismét almárok következhetnek.

Ellenben a legnagyobb faiskolát is a könnyebb kezelést tekintetből nem czélszerű 200 □ ölesnél nagyobb táblakra osztani be és a terület nagyságához arányítva itt is azon sorrend tartatik meg a betelepítésnél, a mint fent elősoroltattott. A leghiányosabb kezelése a faiskolának az, midőn a táblák 10—15 évig sem ürítetnek ki teljesen, hanem a nagyobb csemeték mindig kiszedtetnek és helyükbe más gyengébbek vagy egészen új nemesítések tétetnek.

Az ilyen kezelésnél egy részről a faiskola talaja soha jól meg nem munkálható, minek következtében már a második rendben közé foltozott csemeték is csak sinlődnék és két annyi idő alatt és akkor is elvénuelve nyomorultan érik el a kiültetésre alkalmas nagyságot.

Másrészről az ily iskolában a hasonfajú csemeték szét-szórva és igen ritkán vannak, minélfogva kevés elárusítható csemetéért aránylag sok földet kell munkában tartani úgy, hogy főképp ezen hibás kezelésnek lehet tulajdonítani, hogy igen sok faiskola bevétele nem képes fedezni az évi munkálatokat.

Épen azért, a mint az ojtóványok a kiszabott négy vagy öt éves iskoláztatást elérték, azon táblából mind egy szálgi kiszedessenek és az el nem keltek vagy gyengébbek még legfeljebb egy évig tartalék táblába ültethetők, a silány gyökértelen és annélfogva nem életre való csemeték pedig elajándékozandók vagy eldobandók, hogy ne foglalják el a helyet a fiatalabaktól, melyek szaporítása és nemesítése sokkal kevesebbe kerül, mint semmit nem ígérő élehetlen ojtóvány négy—öt évi ápolása.

A faiskola táblái úgy vágassanak, hogy azokhoz legalább 2 meter széles utakon minden oldalról kényelmesen lehessen jutni azaz, hogy a táblákat választó utakon kívül a kerítés mellett is minden oldalról utak hagyassanak.

A sok és széles utak felette szükségesek a faiskolában mivel azok nemesak a könnyű közlekedést teszik lehetővé, hanem a faiskolának czélja egyuttal az utak mellett anyafákat is tartani, melyek mint termőfák hivatta vannak a gyümölcsfajok azonosságát bemutatni és a faiskolát azon fajok szaporítására hiteles ojtógalyakkal ellátni.

Anyafákul pedig a faiskolában csak törpefák czélszerűek, hogy azok az utak mellett a táblák széleibe elültetve, semmi árnyékot ne okozzanak és helyet is mentől kevesebbet foglaljanak el, mind a mellett mégis sok gyümölcsfaj legyen képviselve. Ezen oknál fogva szükséges az utakat elegendő szélesekre is

készíteni, hogy az anyafák koronái által a közlekedés meg ne nehezíthessék.

Haszon faiskolánál legczélszerűbb az utakat begyepesíteni és azokat időnként megkapálni, hogy a fű tulnagyra ne nőjön. A garacolt és tisztán tartott utak inkább a luxushoz tartanak, mivel azok tisztán tartása többé szokott kerülni a faiskola egész évi kapálásánál. Akár gyepesedve, akár pedig tisztán szándékunk az utakat tartani, mindég úgy készítsük el azokat, hogy a kivágásnál az ut közepéből semmit sem faragunk le, hanem csak a széleinek legömbölyítése által látszik a tábla 15—20 cmnyivel emelkedettebbnek. Az ily domboru utakról a víz is mindig a táblák felé folyván sohasem sárosodnak el annyira, mint az árokszerűleg lemélyített kerti utak.

A táblák széleibe minden oldalon 80 cm.—1 m. széles párkány hagyandó, melynek közepébe az anyafák egymástól 3 meternyi távolságban ültetnek és minden két anyafa közé 2—3 bokor ribizke, vagy köszméte is ültethető, vagy pedig egy részébe szamócza is tétetik, hogy a faiskolának minden legkissebb helye is felhasználtsék.

Párkányok a kerítés mellett is hagyatnak és abba őszi barackfák ültetnek, melyek a kerítésen laposan nevelve semmi helyet nem foglalhatnak el és még is sok gyümölcsöt adhatnak, kivált ha a téli hideg ellen szalma, vagy gyékény takaróval megvédetnek.

Gábor József.

A repceze.

Ezelőtt 15—20 évvel az őszi repceze sokkal nagyobb téren termeltetett, mint jelenleg. Oka leginkább abban rejlik, hogy új, olcsóbb világító anyagok hozatván használatba, a repceze ára is alább szállt. Ezen körülményt bár tekintetbe véve, mégis a repceze termesztését hazánkban indicálva találok; különösen a nagyobb birtokokon termelése több okoknál fogva ajánlható. Ugyanis a repceze termelése nem kíván kerti művelést, a talaj erejét nem veszi szerfölött igénybe, a talajt az azt követő növényeknek mindig jó állapotban hagyja hátra, kora terméséből azonnal pénzrelhet a gazda. Daczára a használatba jött új világító anyagoknak, a repcezeolajnak mégis van jövője. Ugy a mint a gyapot nem képes a kendert és lent kiszorítani, ugy a repcezeolaj használata is, bár világításra kevésbé alkalmaztatik, más oldalról a napról napra hazánkban is szaporodó gazdasági gépek fenntartása több és több repcezeolajat fog igényelni. Jó oldala még az is, hogy a repcezenek mindig akad vevője, a ki a természetöt maga felkeresi, sőt a mint a tapasztalás mutatja, néha lábán is megveszi; ámbár ezen eljárás többnyire a termelő rovására történvén, azért nem igen ajánlható.

A repceze az olajnövények közt első helyen áll, mert legtöbb olajat ad. Leginkább szereti a középkötöttségű, de jó erőben lévő talajt. A kötött, vizes talaj nem repcezenek való. A telet, ha csak igen nagy hidegek nem járnak, különösen a hó alatt igen jól kiállja; leginkább árt neki a száraz erős tél, ugyszinte a fagygyal és olvadással változó időjárás.

A trágyás földet szereti s alája minden állati trágya alkalmas. Legjobb volna ugyan saját pogácsája, mert evvel

visszaadnánk a talajnak mindazon sókat, a melyeket termésével abból kivett; de nálunk, a hol a repezpegácsát takarmányul sem használjuk, azt drágának tartván; trágyának ajánlani akar-ni, igen merész gondolat volna. Bár csak annyira mehetnénk, hogy olajgyárainkból kikerült repce- és lenpogácsát magunk használnánk fel s ne engednénk, hogy az külföldre kivitessék.

Vetése történhetik kézzel szórva vagy géppel sorban; ez utóbbi esetben öszszel lökapával megkapálandó és még tél előtt töltögető ekével felhalmozandó. Ha elegendő erővel nem rendelkezünk és e két munkát végezni nincsen módunkban, akkor előnyösebb a repcét szórva vetni, mert a szórt vetés inkább kiállja az idő viszontagságait, mint a sorba vetett de meg nem kapált s fel nem halmozott repce.

Vetési ideje augusztus 10-től szeptember 15-ig. A vetés-nél ügyelnünk kell, hogy a mag elegendő nyirkosságot találjon a talajban, sokszor egy napi késedelem képes az eredményt meghiusítani. Magam tapasztaltam, hogy egy délutánon vetett repcém megmaradt s már a következő napon vetést ki kellett szántatnom.

Egy hold föld kézzeli bevetésére 10—12 liter elégséges, soros vetőgéppel 5—8 liter. Vetésére legalkalmasabb a Sack és Garrettféle vetőgép, mely 50 cmeternyi távolságra 5 sort vet egyszerre.

Vethetjük lóher, luczerna vagy gyeptörésekbe, trágyázva vagy a nélkül, ez a föld termőerejétől függ; leggyakrabban tiszta trágyás ugarba vettetik s itt igen jó előnövénye a búzá-nak, mert időt enged a talajnak kellő megmunkálására s a talajt tiszta és porhanyó állapotban hagyja hátra. Hogy repce alá hogyan miveljük a földet, az annak minőségétől s az azt megelőző növénytől függ. Ha a repcét tiszta ugarba vetjük, akkor a szerint, a mint a talaj inkább vagy kevésbé kötött, azt többször vagy kevesebbszer kell hogy szántunk; minden körülmény közt czélszerű a talajnak legalább három szántást adni, a kötöttebb talajokon azonban négy szántás sem felesleges, a mikor az első szántás az előnövény letakarítása utáni öszön megej-jendő. Egyszóval iparkodnunk kell a talajt jó porhanyó álla-potba hozni.

A repce érését figyelemmel kísérjük, mert csak egy napi késedelem nagy kárt okozhat. Jele, hogy a repce aratásának ideje elérkezett: ha levelei fonnyadnak, szára és beczői sárgul-nak és a szeme egy kissé barnulni kezd; mihelyt a szemeken egy kis fekete pont mutatkozik, aratásához hozzá lehet fogni, különösen ott, a hol nagyobb területen természetett. Nagyon korán sem szabad a repcét learatni, mert magja színtelen és apróbb lesz, olajat is kevesebbet ad. Learatására lehet sarlót vagy kaszát használni, az utóbbi eszköz azonban alkalmasabb, mert a munkát gyorsítja s olcsóbbá teszi.

Aratás után legjobb a repcét oly kis csomókba rakni, hogy mindegyikét két villás ember egyszerre fölvehesse s a szekérré rakhassa; összerakásánál ügyelnünk kell, hogy a rep-ce feje mind befelé álljon. Összehordására, különösen ha a földön csépettetik vagy nyomtattatik, legczélszerűbb az e czélra készített repcehordó szekér. Áll ez egy 2 meter széles, 3 meter hosszú deszkatáblából, mely a tengelyekre erősítetik, a kerek

32 cm. átmérőjűek s a tábla köröskörül lézczel van beszegé-lyezve azért, hogy a kipergett mag kárba ne menjen. Ha rendes szekereken szállítjuk a repcét, akkor a szekerek mindig pony-vával behorítandók. A szérűhez közelebbi rakásokat kézi sa-raglyán vagy rudakon is el lehet hordatni.

A kiesélt repcemagot mindennap haza kell szállítani, azonnal a zsákokból kiüríteni s a padláson vékonyan elteríteni s gyakrabban megforgatni, mert igen könnyen megmelegszik s megpenészedik. Ha elegendő helyünk nem volna a repce elte-ritésére, akkor polyvástól vastagabb garmadákba is rakható, így a repce biztosabban eláll.

A repce szalmáját kár feltüzezni, polyvája a szarvas-mariának és juhoknak ad jó takarmányt. A mit a marha meg nem eszik, azt alomnak lehet használni.

Walter Lajos.

A víz szerepe az állati bel-gyógyászatban.

Belsőleg a hideg víz hűsítőleg hat a szervezetre és a test hőfokát annál lejjebb szállítja, mentől hidegebb volt. A csak bi-zonyos ideig tartó sok víz felvétel a felvett tápanyagot felhigítja és ez által gyakoribb, higabb és nagyobb mennyiségű kiüríté-seket okoz; különösen emeli a bőr és vesék munkásságát, melyek által a szervezet igyekszik a fölösleget kiküszöbölni magából.

Adagolni lehet lázas betegségeknel, hol a nedvek nagy mennyiségben fogyasztatnak, a szomjusági érzet folytonosan kinozza a beteget és a testnek tulságos nagy hőfoka veszélyez-teti az életet. Ezenkívül vérsűrűségnel, lassu vékeringésnel, gutaütésre való hajlammal, bőrkütegek és pörsenéseknél, hiá-nyos emésztésnel, hol a vastagbélben megrekedt bélsár felhigi-tására és kiürítésére kívánunk hatni. Az utóbbi esetben gyor-sabb és biztosabb hatása lesz, ha glauber — keserü — vagy egyszerűen konyhasót oldunk fel benne.

Lépfene uralgása alkalmával különös gondot kell ferdi-tani az ivóvizre, hogy az mindig friss és tiszta legyen. Ilyenkor czélszerű az egészséges állatok vizébe is valamely savat tenni, hogy a víz kissé savanyus izü legyen. A savanyu ital hűsítőleg hat a szervezetre és a szomjuságot jobban oltja, mint a kö-zönséges víz.

A nagy mennyiségű vízfelvétel nem ajánlható vízkór, vérvizenyösség és hasmenésnel. Ily esetekben nemcsak lehető-leg meg kell vonni az állatoktól az vizet, hanem kerülni kell a vizdus tápanyagok adását is, milyenek a zöldtakarmány, répa, moslák stb.

A meleg víz helyi hatása oldó, puhító, ernyesztő. Alkal-mazni lehet idült daganatoknál, hol lob már nincs jelen és hol a nagyobb foku vértorlódás következtében létrejött kiömléseket izzadmányokat akarjuk eloszlatni. Az idült daganatoknál hi-ányzó visszahatást előidézi a meleg víz az által, hogy nagyobb mennyiségű vér odafolyást eszközöl és ennek következtében nagyobb lesz az anyag-ere is és a kiömlött anyagok felszívód-nak. A melegviz oldó hatását fokozni lehet szappan vagy faha-mu hozzáadása által.

A belsőleg adagolt meleg víz emeli a test hőfokát és gyorsabb vérforgást idéz elő és ez által a bőr kiválasztó tevékenységét fokozza. Adagolni lehet tehát meghűtésből származó hurutos és csuzos betegségeknél és a bőr elnyomott munkásságának felélesztésére; mikor is, ha idejekorán sikerül a test megfelelő izzadását előidézni, igen sokszor nagyobb betegségek kitörését megakadályozhatjuk.

A meleg víz izzasztó hatását emelni lehet az által, ha a forró vízzel fűszeres és illóanyagokat tartalmazó növényi részeket öntünk le és ezek hatásos részeit így kilugozzuk. Ilyenek: a szikfű, hársfa és bodzavirág, a különböző ménták stb. Az így készített forrázatot leszűrve, gyenge melegen kell az állatnak beadni. A belsőleg adagolt forrázatok hatását előmozdítja a testnek ledörzsölése és betakarása, valamint a megfelelő mozgás is.

A nagyobb mennyiségben adagolt meleg víz a kutyák és macskáknál hányást idéz elő és e szerint czélszerűen alkalmazható étvágytalanság, tulterheltség és mindazon esetekben, midőn hányást akarunk előidézni. Mérgezéseknél részint hánytató hatásánál fogva, részint mivel a mérget felhigítja és így hatását gyengíti, nagyon ajánlható a hő meleg víz adagolás, mi egyszersmind a gyors kiválasztást is előmozdítja.

Sárosy Pál.

A madarak haszna.

A madarak rovarpusztításának nagyszerűségéről, mely minden hasonczélra irányzott emberi törekvést messze tulszárnyal, sőt az emberiségre nézve egyenesen a jóllétnek és mi több, az életnek feltételét képezi; számtalan példa tanuskodik. Egy virágházban három magastörzsű rózsán mintegy 2000 levéltetű volt található. Hoztak egy mocsári czinkét és az szárnyra kelve néhány óra alatt az egész mennyiséget elfogyasztotta és a rózsák it teljesen megtisztította. Szobában egy vörös farku zenér légfogását ügyelve meg, kitünt, hogy az egy óra alatt 900 legyet fogott. Egy pár lappantyú este egy negyedóra alatt temérdek szunyogcsomót pusztít el. A királyka párja fiókájának egy óra alatt átlagosan 36-szor visz rovarleledelt.

Gyümölcsös és erdőre nézve a cinke bir megbecsülhetetlen fontossággal, főleg azért, mert kivált a veszedelmes fenyszövcz petéit fogyasztja, holott a szőrös hernyót magát nem bánthatja. Ezen szövcznek nőstény pillangója néha kétszer rak nyaranta 600—800 petét, egy cinke fiaival együtt pedig több ezret fogyaszt el 24 óra alatt. Kisérletükben a királyka úgy télen, mint nyáron szorgosan összekutatja a fákat, gyakran teljesítik ezt a kurta kalapács (poncz) és a fakusz is, melyek a rovarfűszítást nagyon ügyesen huzzák ki a fakéreg hasadékaiból. De a czinkék még a kertben is a legüdvösebben működnek. Így p. o. valaki beszéli, hogy 1848-ban a hernyók véghetetlen száma a fák minden lombját elfogyasztotta, úgy hogy azok pusztán, kopaszon állottak. Ősszel milliónyi petét talált, melyek szőrös hüvellyel borítva, minden törzsön és ágon helyet foglaltak. Nagy költséggel leszedette, a mit lehetett, de csakhamar meggyőződött, hogy emberi kéz nem bírja e csapást elhárítani és el volt készülvé arra, hogy legszebb fái

odavesznek. Ekkor történt, hogy télfelé naponta nagyszámú cinke és királyka kereszte fel a kertés és a hernyófészkek szemlátomást apadott. Tavasszal közel 20 cinke pár telepedett le a kertben és már azon a nyáron határtalanul megfogyott a hernyó, míg végre 1850-ben a kis tollas kertészek annyira megtakarították a fákat, hogy szives és buzgó készségük folytán ismét a legszebb zöld lombbal diszelegtek.

Egy verébpár fiainak hetenként 2000 hernyót visz, a mi egy marék cseresnyével vagy kalással kétségkívül felér! White angol természettudós huzamosabb ideig figyelt meg egy lángbagoly párt és azt látta, hogy öt percenként egy-egy egeret vitt fészkebe. Egy kuvikpár valamely juniusi este 11 egeret hozott fiainak.

A thüringiai állatvédegylet következőleg mutatja ki az 5 fiókás zenér, vörös farku zenér vagy hasonló madár fészkenek tápfogyasztását: minden egyes fiókának naponta átlagosan mintegy 50 hernyóra vagy más rovarra van szüksége, melyet az öregek a szomszédságban szednek össze, naponta kell tehát 250 darab és miután az etetés átlagban véve 30 napig tart, ez fészkenként 7500 darabra rug. Tény, hogy minden hernyó naponta saját súlyával felérő lombot és virágot fogyaszt el. Feltéve, hogy neki is 30 napi tápra van szüksége, feltéve, hogy naponta csak egy virágot pusztít el, melyből gyümölcs lett volna, akkor egy hónap alatt 30 gyümölcsöt, a 7500 hernyó pedig összesen 225.000 gyümölcsöt tesz tönkre. Ha azonban a hernyó, mint az gyakran előfordulhat, 10—30 virágot emészt fel egy nap, vagy pedig, ha a lekopasztott lomb miatt a virágoknak már táp nem juthat, akkor a veszteség még sokkalta nagyobb. Ha egy királyka párnak fióka van fészkeben (évenként kétszer 6—11 darab) akkor a két öreg óránként 36-szor visz eledelt, tehát naponta 576-szor. Már most számítsa ki valaki minő borzasztó mennyisége pusztul el a legkártékonyabb rovaroknak a fenyvesből, ha csak 8 párt számítunk is egy holdra kétszeri költéssel. A kék cinke minden párja kétszeri költésre 120-16 fiókát nevel és ha ezeknek tápszükségletét csak felére tesszük, mint az öregekét, mégis mint évi fogyasztást egyetlenegy kék cinke családra 20 millió rovarpetét lehet számba vennünk. Egy fecskepár naponta 16 órát mozog és mindegyik átlagosan óránként 20-szor táplálja fiókáját, mindkét szülő tehát vagy 600-szor fordul meg a fészekenél. Miután már most az öreg fecske mindenkor 10—20 rovarhoz, ebből folyólag egy fecskepár napjában legalább 6400 rovarot pusztít el. Saját fenntartásukra az öregek mintegy 600 szunyogot és legyet igényelnek, úgy hogy a fecskecsalád naponta 7000, havonként 210.000 kártékony rovarot semmisít meg. Ha az öreg fecskék az első hóban, midőn egyedül vannak 30.000 rovarot fogyasztanak, úgy a 7 tagu családra nyáron át 576.000 rovar esik. Ha már most egy faluban csak 100 fecskepár rak fészket, ezek ivadékaikkal együtt nyáron át 75 millió rovarot pusztítanak el!

Kevés tartományt találunk, hol a mezei termények oly nagy hozamot adnának, mint Holsteinban, Lombárdiában és Szász-Altenburgban. A két első ezt nagyrészt a sok bagolynak, Altenburg a seregélyeknek köszönheti. A holsteini falvakban a telő geruczo alatt nyílás van, a „bagolylyuk“, hol a baglyak

járnak ki és be, sőt Olaszországban a városi házak is a kuvik számára nyílásokkal vannak ellátva, miglen Altenburgban számos seregély fészkelő láda van elhelyezve.

Ime e kevés, de hatalmas és meggyőző példából újabb utmutatást merithetünk arra nézve, hogy leghivebb szövetségeseinket tőlünk telhetőleg megbecsüljük és védjük. E tekintetben segítségünkre lehet a törvény, ha majd lesz; támaszul szolgálhat a szabályrendelet, ha egyéb nagy dolgaink mellett ily kicsiségekre reá érhetnének; de mindezeknél inkább és jobban foghatni az iskola, a köznevelődés általános fejlesztése és terjesztése, a természeti összhangnak kimutatása és megfigyelése által.

P. L.

Az erdőtörvényjavaslat

az Országos Erdészeti Egyesület elnöke Tisza Lajos elnökle alatt működött szaktanácskozmány által megállapított szöveghez szerint a f. évi májushó 18-án tartott ministeri tanácsban tárgyalatott és ott a javaslat általában helyesnek és elfogadónak lett ismerve, nevezetesebb észrevétel csupán az erdőkárosításoknak elbírálása, továbbá a kopár területek beerdősítése és az usztatás kérdése körül merültek fel, és pedig az elsőre oly irányban, hogy annak határozmányai a büntető törvényről és a rendőri kihágásokról szóló törvényjavaslattal hozassanak összhangba és, hogy a károsítások általában mely hatóság előtt bíraltassanak el; a kopár területekre nézve, hogy az ezek beerdősítése céljából szükséges állami pénzsegély az állam pénzügyi viszonyaival szemben az illetők által törvényes alappal birható követelés útján tulságos mértékben ne vétethessék igénybe, és hogy az usztatás és tutajozásról szóló határozatok a parti jogok kellő figyelemben tartása mellett a vízrendőrség követelményeinek igényeivel összeegyezőbben módosittassanak.

Ennek folytán a szakbizottság jun. 13-án újabb tanácskozást tartott, melyben azon megállapodás történt, hogy a kopár területek beerdősítését tárgyzó fejezet megfelelő módosítására Ribáry ministeri tanácsos és Bedő, a viziszállításta, Hieronymi államtitkár és az erdőkárosítások hatóságát és eljárását tárgyzó fejezetre Csemegi államtitkár készitsenek javaslatot. Junius 15-én a törvényjavaslat ügyében egy újabb ministeri értekezlet tartatott, melyben a minister urak valamennyien résztvettek és továbbá jelen volt a szakbizottság elnöke; az igazság-, a bel-, a földmivelés- és a pénzügyministerium képviselői. Ezen tanácskozásnak célja volt az iránt jönni megállapodásra, hogy az erdőkárosítások birói, vagy közigazgatási uton íteltessenek-e el; beható tanácskozás alapján abban történt megállapodás, hogy a károsítások bizonyos összegig, vagyis azon fokig, mely az erdővédelem sikeres eszközölhetése végett a gyorsabb eljárási módozat szükséges, közigazgatási uton bíraltassanak el, és csak a megállapítandott összegnél nagyobb értékű, tehát gyéreb, de behatóbb tárgyalást is igénylő károsítások tartozzanak a rendes bíróságok elé. (F. É.)

Vidéki gabona- és borvásár.

Zalamegye gazdasági egyesülete a mult évi gabona- és borvásár kedvező eredménye folytán és egyetértve a nagyka-

nizsai kereskedelmi testülettel Nagy-Kanizsán, 1877. augustus 23-án egy II. vidékbeli gabona- és borvásárt fog rendezni. A vásár az „Arany szarvas” című szállodában tartatik meg, valamennyi üzletkötés a budapesti áru- és értéktőzsde szokványaira való hivatkozással fog történni.

Azon résztvevők, kik eladás végett bormustrákat kiállítani szándékoznak, megkéretnek, miszerint e célra minden borfajtából legalább 0.5 litert tartalmazó 4—4 palaczkkal a bor fekhelyét, úgy az eladásra szánt borok fajtát, mennyiségét és árát kitüntető jegyzék kíséretében legkésőbb f. é. augustus 19-ig a rendező bizottságnak díjmentesen beküldeni sziveskedjenek annyival inkább, mivel e jegyzékek kinyomatván a vevő közönség között ki fognak osztatni. — A palaczkok vignetteire a hegy neve, a termés évszáma és a bor ára szinte feljegyzendő. Gondoskodva lesz, hogy minden kiállítónak bora elkülönítve elhelyeztessék és az eladó vagy megbizottja által a vevőknek bemutatassék. A beküldött borminták elhelyezését és kiállítását a bizottság díjmentesen eszközöndi. A beküldött palaczkok és a fönmaradó bor az egyesület tulajdonává válnak.

Bővebb részletekkel kívánatra a rendező bizottság szolgál.

Könyvismertetés.

Rövid utmutatás községi faiskolák céljai és hasznairól, Néptanítók és mindenrendü fatenyésztőknek írta Gaál József. Szeged 1877. Burger Zsigmond özvegyénél, ára 20 kr.

A 40 nyolczadrét lapra terjedő, két ábrával ellátott művecske már több lapban lett ismertetve és általában mindannyija kedvezően szólott fölöle és nem egy, teljes elismeréssel ajánlotta az illetők figyelmébe. Mi sem tehetünk mást, mint e valóban életre való, jó munka fölöl hasonlóan nyilatkozunk. Ily rövid művet e téren még nem láttunk, hanem azért tökéletesen megállja helyét, mely szerző valódi szakemberségéről tanuskodik. Már címje mutatja, hogy miczélből és kiknek iratott; azonban haszonnal olvashatja és alkalmazhatja azt minden afféle ember, aki szereti a természetben ültetni, öntözni, szóval kertészkedni. Részletes ismertetésébe nem bocsátkozunk, hiven, hogy azt minden ügybarát megszerzi és így színről-színre látni fogja az abban foglaltakat. Vegyük és vétecsük meg hát sokakkal, hogy terjedjen a jó, minél szélesebb körben. Adjuk kezébe főkép a tanügyi-intézeti vezetőknek, ha máskép figyelmöket kikerülte volna, hadd lássák, mint és hogyan kell tenniök és tétetniök a reájok bizott növendékekkel, hogy ily fák plántálása által is mindinkább közeledhessünk a cél-, a tökéletesség felé, — hogy édes hazánk e tekintetben is paradicsommá tétethessék. Vannak ugyan e műnek itt-ott, számba sem vehető kis hibái, de a melyek inkább tájkifejezések lévén, annak becsét nem csonkitják és a melyeket bárki az első tekintetre képes kijavítani magának.

Dolgozz, vagy nyomorogsz! ez az „amerikai kertészgazda” jelszava, mely szentigazságból folyólag

Helyes ismeretekkel az észben
Éles késsel a kézben.

Munkáljunk mindannyian a nekünk jutott talentumokkal hazánk fölvirágzása és boldogítására, hogy meghallhassuk ama régen mondott és mindig igaznak maradó biztató hangot: jól vagyon jó és hiv szolgálom, a kevesen hiv voltál, többre bizlak ezután.

Sz. L.

Vidéki gazdasági tudósítások.

Mócs, 1877. július 15-én.

Az aratás veszi kezdetét, őszi búzánk 4—5 szemre, rozs nagyobb részt elpusztulva, alig 3—4 szemre biztat. Tavaszszűzük lennének, de mag hiján és rozs idő miatt nagyon kevés vetődött, törökbuza termésre, mely a nép kenyere, számítani nem lehet, mert lágyban vetődtek és e vetést az állandó szárazság megfojtotta, a mit kínosan kikapáltak is belésárgult. Szőlő, gyümölcs alig lesz kostolóra. Széna termést jónak lehet nevezni, a legelők jól zöldeltek, de kezdik a szárazságot sinleni, a leirt állapot Mócsból—M.-Vásárhely—Szász Régen—Lekenczég egyforma és így vidékünkre nézve rozs évnek nevezhető, mert ha pincs törökbuza, éheznek a nép. A Szent-Péteren folyó vásár lovakra nézve gyenge, de az ökröket drágán fizetik.

Nagy József.

Földvár-Hídvég, 1877. július 16-án.

A szénacsinalást nagyon jó időben végeztük el, szénánk azonban kevés lett, mert a sok árvíz miatt későn nőtt a fű. Az aratást ma kezdtük meg, ugylátszik a buza jól fog eresztetni, míg a rozs csak közepes termést ígér. Törökbuzaink és zabjaink nagyon jók. Július 9-én délelőtt 11 órakor nagy zápor esőnk volt tyuktojás nagyságu jéggel, de csak kevés ideig tartott és inkább a réten járt, minél fogva a határon kevés kárt tett. Szarvasmarháink, valamint a sertések között is, a szájlájás erősen uralkodik.

Kónya Miklós.

Szász Fenes, 1877 július 16-án

Szénatermés mennyisége, minősége kielégítő, oldalos szénafüvekről nagyon jól gyűlt össze. Törökbuza másodkapálása után az elmaradottságot utólerzte, jól mutat. Burgundi répa késői vetetés miatt hátra van. Luczerna másodkasználása is jó. Aratás ma veszi kezdetét, a rozs elébb érett, ritkás, feje nagy, de rovásos, eresztésre nem nagyon biztató. Tiszta buza szép, sok döltes, termése azonban mégis biztató. Tavasz szalmás, tavaszbuza, árpa, zab kitünő. Állatok jó legelőn egészségesek. Napszámviszony rendes.

Szabó József.

Küküllővár, 1877. júliushó 16-án.

A tavasz folytonos esőzések megszüntte óta (május 28), csak egyszer (június 24) részesültünk egy körülbelül 12 óra hosszát tartó csendes esőben, mely a már erősen megkeményedett földet jól átázta és az akkor több helyt megakadt törökbuza első kapálását lehetővé tette; ugyszintén a korábban első kapálást nyert törökbuza másodolása könnyen és tökélyesen végezhető volt. Ezen eső után kezdtünk és nagy utánlátással végeztük is az ugarlást, mely munka a községbelieknél általában véve $\frac{1}{4}$ részben sincs megejtve. A törökbuza e község határan igen különbözők; a korai vetések, a kapálási munka kellő végzésével szépek, a későbbiek azonban gyengék és nagyon érzik a szárazságot és ha hamarjában eső nem köszönt be, a szép törökbuzaikkhoz kötött reményeink is meghiúsulnak. A mesterséges takarmányosaink is — melyekről egy igen jó minőségű hozamot takaríthatunk be — eső után sovárognak. A szénarétek a tavasz árvizek folytán az idén mondhatni $\frac{2}{3}$ részben semmi termést nem fognak adni, az $\frac{1}{3}$ rész is csak közepes termést ígér, mely még, miután csak mostanában nőtt a fű rajta, lekasálva nincs. Az aratás azon ha tárrészben, hol a május 17-iki nagy jégverés nem járt, kezdetét vette és jó termést mutat fel. Azon őszi vetések azonban, melyeket a

jég teljesen elvert, kisarjadztak és tiszta búzánál azon esetre, ha a most folyó szemképzésre esőt kapunk, meglehetősen jó termésre számíthatunk, ennél az aratás körülbelül 2 hét múlva veszi kezdetét; a rozs azonban a jégcsapás idejekor fejlődésében előrehaladottabb lévén, csak ritkán sarjadzott és a kalászkok is nagyon kicsik lettek, úgy hogy sarlóvali aratásra nem érdemes. A jég által károsított repcze levágása most folyik.

Balaskó Ferencz.

Szepsi-Sz.-György, 1877. júliushó 16-án.

Tavaszi nedves időjárás a vetés munkát hátráltatta és azután következett száraz időjárás a kapás növények megmunkálását nehézkeseen engedte folytatni, úgy hogy folyóhó 13-án is kaszáttak. Folyóhó elején esett 24 órai eső sokat segített a tavaszok gyarapodásán. Lentermelésünk ügye jó reményt nyújt, mert a s.-sz.-györgyi határt kivéve, a próbavetések mindenütt sikerültek, a szál magassága mindenütt egy meter és azonfelül is. Dohányaink aprók a késő ültetés miatt. Szénacsinalás kitünően végződött a rendkívüli időjárás miatt. Az első kalangyát e hó 13-án láttam, nagyon, csak e hét végén vagy a jövő héten kezdetük meg. Őszi termés tökéletes. Jégverés csekély mértékben történt pár határon. Ugarlás hátraesett a szárazság következtében, csak most vagyunk a munka közepén, mi megint fennakad, ha még nem kapunk kevés esőt. Hihetőleg két szántásba fognak vetni a gazdák. Lóheréseinket, száraz fekvésű füveseinket és legelőinket az aranka bámulatosan pusztítja, még a fekete borsó takarmányosban is találtam pusztítást. Állategészség kitünő.

Bene József.

Szász Régen, 1877. júliushó 17-én.

Az aratást a hét elején rozsszal kezdtük meg, búzánk még nem lévén megérve, ott is, a hol a tavasz esők gabonáinkat el nem pusztították, a kalangyák felelte ritkás; a szem a hőség miatt összeaszott, úgy hogy vékába is keveset fog eresztetni, előre kimondható, hogy őszi rosz termésünk van. A törökbuza is sinyli a hőséget, sarjunk a legjobb réteken sem lesz, ha hamarjába esőt nem kap, jórészt szénatermésünk is egy jó harmadrésznél kevesebb, mint a tavali. Havasalji falvainkban a zab nagyon silány. Egész vidékünkön a gazdákra nézve szomorú a kilátás.

Schuller Dániel.

Magyar-Igen, 1877. júliushó 18-án.

E hó 9-én kezdetét vette az aratás és pedig rozs volt az első a mi vágatás alá került. Gabnáink rendre érve meglehetősen munka besosztást engedtek, minek nagy hasznát vettük, mert még a törökbuzaikkra, szénáinkra is fordíthattuk figyelmünket, melynek betakarításával igen elkéstünk, de még el sem végeztük, hanem másképp nem tehetünk. Az aratás néhány nap múlva véget ér az ősziokban, a tavaszok kissé elmaradtak, ezek közül a zab, mi itten nagyon kevés mennyiségben vettett ősögös, mely különben buza és rozsban is található, de csekély mértékben. Rozsda nem bántotta gabonáinkat. Hozamról átlagban még nem szólhatok, de egyesek csépeltek már, rozsból holdankét 20—25 kalangya á 30 kéve, adott egy kalangya 1 hectolitert tehát egy holdon 20—25 hltr, mi „jó” hozamnak mondható, mert a szemek is szép nagyok és épek, kevés van köztük léha. Az aratás folyama alatt kétszer volt zivatar, az első e hó 11-én a délutáni órákban, melyet erős jég kísért, miből még következő nap déltájt is találni lehetett nagy mennyiségben. Szőlő termésinknek felét fönkre tette, biztosítva egy sem volt. Második volt e hó 16-án, ez annyiban okozott kárt, hogy roppant erős szél kíserte, mely a még le nem aratott gabonát egészen lefektette, a kevés gyümölcsöt úgy szőlván mind leverte, sok lát összetört, a szőlőt újra megrongálta. Törökbuzaikk állagban „jó”, nemsokára tejes csöveket találhatunk. Rétek jó sarju hozamot ígérnek, a legelő szarvasmarháinak gyenge, juhoknak kielégítő. Kertjeinket en nem nagy örömet látunk, mert gyümölcs nincs, burgonyánk lesz. Marháink, a sertéseket kivéve, melyek közül néhány lépfenében elpusztult, egészségesek. Gabonáink valamivel csökkentek, a napszám azonban még mindig magas.

Rösler Károly.

Piaci árakat illetőleg

megjegyezzük, hogy Beszterce, Déva, Fogaras, Gy.-Fehérvár és Vajda-Hunyad újabb heti vásáraitól tudósítást nem vettünk, a dévai gabna árak 100 kilogrammonként vannak jegyezve. — A hectoliter árának átszámítása a régi mértékre nagyon egyszerű: az összeg egy hetedrészét leütve, a maradék a gyakorlat igényeihez képest elég pontosan három véka árának felel meg. P. o. buza hectoliterje 840 kr., leütve a hetedrészét. 120 krt, marad 720 kr., mint három véka, tehát 240 kr, mint egy vékanak ára!

Felelős szerkesztő: GAMAUF VILMOS.

Hirdetések.

Ajánlat

egy tizennyolcz ló erejű alig használt fekvő **GÖZGÉP**, egy nyolcz ló erejű ujonnan felszerelt tökéletes jó állapotban levő **GÖZMOZDONY**, egy négy ló erejű egész új, álló kazánra szerkesztett **FRANCO GÖZGÉP** kapható **JUTÁNYOS ÁRAK** s **KEDVEZŐ FELTÉTELEK** mellett. (32.) (2-3)

Walsér Ferencz első magy. gép- és tüzelő szerek gyára, harang- és rézöntődének erdélyrészi fiók telepe által Kolozsvártt, bel-monostorutca 12. sz. a.

Ajánlkozás.

Egy gyakorlott gazda, ki a jogi- szám- és könyv- viteli téren is teljes készütség és praxissal bír; vállalkozik egy nagyobb birtok vagy uradalom vezetésére vagy igazgatására. (33) (1-3)

Jutalékát csekély fixum mellett a birtok ez idő szerinti jövedelmén felül által elérendő felesleg jövedelemből kívánja megállapíttatni.

Bővebb értesítéssel Pusztá-Poon (posta és vasut-állomás) Dömötör László szolgál.

Jelzálogkölcshöz

a birodalom bármely részében, telekkönyvezett nem tehermentes földbirtokra 1000 frttól a legmagasabb összegig 5 és 6% kamat mellett törlesztésre, rövid idő alatt és 5000 frton felülieket még előnyösebb módozatok mellett gyorsan eszközöl, bővebb felvilágosítással készséggel szolgál.

a hatóságilag engedélyezett általános
(3) (15-26) „Ipar és keskedelmi ügynöki iroda“
Kolozsvártt, párisutca, 19. sz. saját ház.

(Ertekezhetni személyesen vagy posta útján naponta d. u. 1-4 óráig)

Piaci árak.

A heti vásár		Egy hectoliter (=70 kupa)						100 kilo		1 kobmeter	1 kito
helye	napja	tiszta buza	elegy buza	rozs	árpa	zab	törökbuza	széna	szalma	tüzifa	marhahus
á r a k r a j o z á r o k b a n											
Beszterce	febr. 6	950	850	460	—	230	32	280	110	320	28
Zrassó	jul. 13	940	715	555	500	325	420	190	110	350	40
Csik-Szereda	jul. 11	1050	825	600	550	300	500	300	150	175	30
Décs	jul. 17	840	750	480	—	240	550	520	240	200	36
Déva	jun. 23	1100	700	950	—	860	720	300	180	220	36
Erzsébetváros	jul. 14	780	630	500	—	450	450	180	140	300	40
Fogaras	dec. 7	775	710	450	450	200	600	140	30	—	24
G.-Fehérvár	jul. 7	900	626	550	—	—	540	350	170	310	44
Gy.-Sz.-Miklós	jul. 14	1025	700	550	500	275	475	100	25	—	32
Kolozsvár	jul. 19	—	—	570	—	—	553	170	140	320	42
M.-Vásárhely	jul. 12	850	615	515	415	315	420	300	70	330	38
Naszód	jul. 12	1065	—	—	—	300	550	100	60	200	28
Nagy-Enyed	jul. 12	825	700	575	—	400	550	260	80	235	40
N.-Szeben	jul. 17	910	750	530	600	370	600	140	140	300	42
Segesvár	jul. 12	800	600	500	—	350	500	160	80	160	40
S.-Sz.-György	jul. 16	880	800	540	500	320	400	250	150	200	36
Szamosújvár	jul. 16	1050	640	590	—	295	490	360	75	400	34
Sz.-Rógen	jul. 12	725	525	455	355	280	550	200	100	240	36
Sz.-Udvarhely	jul. 17	950	700	600	—	375	520	160	40	200	28
Torda	jul. 14	850	550	500	300	300	525	250	36	320	36
V.-Hunyad	jun. 30	950	800	700	—	400	600	160	100	300	40

Melléletek

100 darabonként 1 forint 40 kr-ával számíttatnak.

A hirdetés szövegét a t. megrendelők minden külön díj nélkül tetés szerint akárhányszor változtathatják.

Az „Erdélyi gazda“ hirdetési díjszabályzata.

A kívánt tér megnevezése	s z e r i h i r d e t é s n é l										
	f o r i n t										
	1	1-3	1-6	1-12	1-18	1-24	1-30	1-36	1-42	1-52	
1/16 v. egész oldal	12	33	64	120	170	216	260	290	320	360	
8/16 v. fél „	6	17	32	60	90	110	130	150	160	180	
4/16 v. negyed „	4	9	16	30	45	55	65	75	80	90	
2/16 v. nyolczad oldal	3	5	9	16	24	30	35	40	45	50	
1/16 v. tizenhatod „	2	3	5	9	15	18	20	23	25	27	

Ezenkívül 30 kr. bélyegdíj annyszor, a hányszor a hirdetés megtelenik.

Egyletünk t. tagjai és lapunk t. előfizetői

25% vagyis egy negyedrészt, engedményben részesülnek, ha hirdetésük beküldésekor tagsági vagy előfizetői minőségükre hivatkoznak.