

17

R. JEANNEL

BCU Cluj / Central University Library Cluj

UN NOUVEAU DRIMEOTUS ENDOGÉ DES MONTS BIHAR.

Un nouveau *Drimeotus* endogé des monts Bihor

par le

Dr. R. Jeannel

Professeur à l'Université de Cluj

Sous-directeur de l'Institut de Spéologie.

Déposée le 30 mars 1923.

Drimeotus (s. str.) *Breiti*, n. sp. — Deux femelles recueillies par M. J. BREIT, sous de grosses pierres enfoncées à Stână de Vale [Biharfüred] (județ Bihor, Roumanie), le 6 septembre 1912.

Long. 3,7 mm. Roux testacé brillant. Forme générale convexe et peu large, rappelant celle du *D. Horváthi*. Ponctuation relativement fine pour un *Drimeotus* s. str.; les points sont fins et très serrés, réguliers sur le pronotum, petits et vaguement alignés en travers sur la base des élytres, plus gros mais irréguliers et assez superficiels sur le disque et l'apex des élytres. Pubescence dorée, peu fournie, assez courte, à peine plus longue que chez les espèces du sous-genre *Bihorites*.

Antennes grêles, atteignant le milieu de la longueur du corps; le funicule grêle, les articles apicaux fortement épaissis à leur extrémité distale, l'article VIII petit, à peine plus long que large, guère plus long que la moitié du IX.

Pronotum nettement transverse, d'un tiers plus large que long, nullement rétréci à la base; sa forme est à peu près celle du *D. Kovácsi*, mais la moitié basale des côtés est plus profondément échancrée, les angles postérieurs sont un peu saillants en arrière, le disque est plus convexe. Pas de rebord marginal.

Elytres convexes, elliptiques allongés, peu larges, environ une fois et demie aussi longs que larges et d'un tiers plus larges ensemble que le pronotum. Les quatre côtes du disque sont relativement bien saillantes; la gouttière marginale est large et explanée, moins large cependant que chez *D. Kovácsi*, mais de même largeur que chez *D. Horváthi*. Le bord externe des élytres porte une frange de poils très courts.

Carène mésosternale régulière, formant un angle obtus à

sommet très arrondi; les bords non échancrés. Pattes grêles et relativement courtes.

Le *D. Breiti* prend place dans le sous-genre *Drimeotus* s. str., à cause de sa ponctuation irrégulière et peu serrée sur le disque des élytres, de la large gouttière marginale ciliée de ces derniers et de leurs côtes saillantes. Mais il est visible que ces caractères sont atténués chez *D. Breiti* par rapport à leur développement chez les autres espèces du groupe. D'autre part *D. Breiti* rappelle un peu les espèces du sous-genre *Bihorites* par la brièveté de sa pubescence. Il n'est d'ailleurs pas surprenant de trouver chez cette espèce nouvelles des caractères intermédiaires à ceux des deux sous-genres. On sait en effet que la différenciation des *Drimeotus* s. str. et du sous-genre *Bihorites* a été produite par isolement géographique sur les deux régions calcaires du nord et du centre du Bihor⁽¹⁾ et on peut constater (voir la carte, p. 417) que Stănă-de-Vale se trouve précisément dans une position intermédiaire à ces deux régions. Il y a lieu cependant de noter que les *Duvalites* de Stănă-de-Vale (*D. cognatus*, *D. Eleméri*, *D. Breitianus*⁽²⁾) appartiennent tous à des groupes répandus sur les massifs calcaires de la région centrale, tandis que par contre le *Drimeotus* de cette station se rattache à la faune de la région nord.

Dans le groupe des *Drimeotus* s. str., *D. Breiti* constitue donc une espèce bien distincte. On pourra l'insérer dans le tableau de détermination des espèces du genre (ce *Bulletin*, p. 440) de la manière suivante:

- 7. Ponctuation des élytres forte et profonde, les points non alignés en travers. Long. 3,8 mm. Horváthi Biró.
- Ponctuation des élytres moins forte et plus superficielle, les points vaguement alignés en travers sur la base. 7 bis.
- 7 bis. Pubescence des élytres courte, les poils de la frange marginale plus courts que la largeur de la gouttière marginale de l'élytre. — Pronotum transverse, élytres convexes. Long. 3,7 mm. Breiti Jeann.
- Pubescence des élytres longue, les poils de la frange marginale au moins aussi longs que la largeur de la gouttière marginale de l'élytre. Long 3,5 à 4 mm. Kovácsi Mill.

(1) R. JEANNEL. Etude préliminaire des Coléoptères aveugles des monts Bihor (*Bul. Soc. Șt. Cluj*, I, p. 419).

(2) M. J. BREIT m'a communiqué un mâle de cette espèce recueilli en même temps que les deux *Drimeotus* décrits dans cette Note.