

UN NOUVEAU DUVALIUS DE L'OLTÉNIE

Dr. R. JEANNEL
Professeur à l'Université de Cluj

72

R. JEANNEL ET J. DE MALLÁSZ

BCU Cluj / Central University Library Cluj

UN NOUVEAU DUVALIUS DE L'OLTÉNIE.



Duvalius (Duvalius) ... long 1.2 mm. Cette espèce grise et opaque, vue par l'aspect du II, se distingue par sa caractéristique par la forme de son pronotum et sa base ovulaire.

Tarses pâles. Tous aléutés, 7-8 coupes par segments, comme chez les *D. scaber* et *D. heister*, mais à l'air de petits insectes aléutés bipennés. Antennes semblables à celles de *D. heister*. Pronotum à peine plus large que long, ses extrémités postérieures, caractéristique de cette espèce, sont les mêmes qu'elles de *D. scaber* de la région. Le bord marginal est à peine plus avant les angles postérieurs, mais sans petits et fins, mais un peu saillante, plus ardue que la part antérieure. Elytres courts, à base, à la région caractéristique, semblables à ceux de *D. scaber* de la région.

1955. Cluj. Type: un individu de la région de Cluj, trouvé par moi-même. (Collé par moi-même dans le musée de Cluj).
© R. Jeannel, 1955. Tous droits réservés. Toute réimpression sans autorisation de l'éditeur est formellement interdite.

UN NOUVEAU DUVALIUS DE L'OLTÉNIE

par le

Dr. R. Jeannel

Professeur à l'Université de Cluj

et

J. de Mallász

Directeur du Musée de Déva

Reçue le 18 mars 1929.

Les recherches récentes de l'un de nous (J. de MALLÁSZ)⁽¹⁾ et de P. A. CHAPPUIS et A. WINKLER⁽²⁾ dans l'Hunedoara et l'Olténie occidentale, ont fait connaître toute une série d'espèce et de genres nouveaux de *Trechinae* et de *Bathysciinae* de cette partie jusqu'ici peu connue des Carpathes méridionales. Nous nous proposons de faire paraître prochainement une étude plus détaillée de la faune cavernicole de cette région, mais nous voulons seulement dans cette note, donner la diagnose préliminaire d'une espèce récemment découverte.

Duvalius (Duvaliotes) Spiessi, n. sp. — Long. 4 à 4,2 mm. Petite espèce grêle et allongée, ayant un peu l'aspect du *D. Stilleri* Reitt., mais très caractérisée par la forme de son pronotum et sa pièce copulatrice.

Testacé pâle. Tête allongée, à tempes peu renflées, comme chez les *D. Stilleri* et *D. Hegedüsi*. Yeux à l'état de petite tache elliptique blanchâtre. Antennes semblables à celles du *D. Hegedüsi*. Pronotum à peine plus large que long, ses côtés très peu arrondis, contrastant en cela avec toutes les autres espèces de *Duvalius* de la région. Le bord marginal est à peine sinué avant les angles postérieurs, qui sont très petits et vifs; base un peu saillante, plus étroite que le bord antérieur. Élytres longs et étroits, à épaules arrondies, semblables à ceux du *D. Stilleri longulus* Jeann.

(1) J. de MALLÁSZ. Raport preliminar despre noile Coleoptere troglodite din județul Hunedoara. (*Publicațiile Muzeului jud. Hunedoara, Deva*, 1928, p. 124—135).

(2) R. JEANNEL. Diagnoses préliminaires de Coléoptères cavernicoles nouveaux de l'Olténie. (*Bull. Soc. ent. France*, 1928, p. 267—273).

Mêmes caractères chétotaxiques que chez *D. Hegedüsi*.

Organe copulateur de forme analogue à celle du *D. Hegedüsi* (1), aussi grêle et arqué, mais avec la partie apicale un peu plus épaissie. L'orifice apical du pénis porte à son côté dorsal une forte ligula, très chitinisée et brunâtre, de forme triangulaire, allongée, avec son bord libre largement tronqué. La pièce copulatrice, très différente de celle du *D. Hegedüsi*, est très courte et très large, un peu en demi-lune comme celle du *D. Hercules* (l. c., p. 480); mais son côté gauche porte une longue épine latérale, coudée et très effilée, tout à fait caractéristique.

Cinq exemplaires recueillis par J. de MALLÁSZ dans une grotte dite : Peșterea lui Mihail Arjoc, aux environs de Cloșani, județ Mehedinți, en Olténie.

Cette petite espèce appartient sans aucun doute au groupe du *D. (Divaliotes) Budai* et doit se placer à côté du *D. Hegedüsi*. Son pénis muni d'une ligula et sa pièce copulatrice rappellent le *D. Hercules* et surtout le *D. spinifer* Jeann., espèce de très grande taille, vivant aussi en Olténie, mais dont l'épîne apicale de la pièce copulatrice est médiane.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

(1) R. JEANNEL, Monographie des *Trechinae*, 3^e partie, p. 477. (*L'Ancelle*, Paris, XXXV, 1928).